

بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گونه‌های گیاهی رویشگاه توس منطقه‌ی مارمیشو، استان آذربایجان غربی

آرزو محمودی^۱، جواد اصحابی‌راد^{*۱}، احمد علیجانپور^۱ و مهناز حیدری ریکان^۲

^۱ ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری

^۲ ایران، ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ دریافت: ۹۶/۲/۱۷ تاریخ پذیرش: ۹۷/۴/۱۲

چکیده

منطقه مارمیشو واقع در ۷۰ کیلومتری شمال‌غربی شهرستان ارومیه از رویشگاه‌های مهم توس (*Betula pendula* Roth) در ایران محسوب شده و با سطحی معادل ۶۰ هکتار از تنوع گیاهی منحصر به‌فردی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی فلور، شکلهای زیستی و کورولوژی گونه‌های چوبی و علفی رویشگاه توس منطقه است که از رویشگاه‌های کران‌رودی و با گونه‌های همراه بید، دارمازو و گز می‌باشد. ۳۰ قطعه نمونه به روش نمونه‌برداری منظم، تصادفی با ابعاد شیکه 200×100 متر در منطقه مورد مطالعه پیاده شد. در هر نقطه، قطعات نمونه 400 مترمربعی برای جمع‌آوری گونه‌های درختی و درختچه‌ای و قطعات نمونه 100 مترمربعی برای جمع‌آوری گونه‌های علفی پیاده شد. نتایج نشان از شناسایی و حضور ۲۵۱ تاکسون گیاهی متعلق به ۵۱ خانواده در محدوده بود که از این تعداد، ۲۸ گونه درختی و درختچه‌ای می‌باشند. بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی منطقه مربوط به خانواده Asteraceae با 40 گونه، خانواده Apiaceae با 22 گونه، خانواده Fabaceae با 21 گونه، Lamiaceae با 20 گونه و خانواده Brassicaceae با 17 گونه می‌باشند. از نظر شکل زیستی رانکایر، همی‌کریتوفتیت‌ها با 122 گونه، تروفیت‌ها با 51 گونه، فانروفیت‌ها با 28 گونه بترتیب بیشترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر جغرافیای گیاهی بیشترین عناصر رویشی منطقه متعلق به ناحیه رویشی ایرانی تورانی (115 گونه) و ایرانی-تورانی/ اروپا-سیبری (59 گونه) می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: مارمیشو، توس، کورولوژی، فلوریستیک، شکل زیستی.

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۴۴۳۲۷۷۰ ۴۸۹، پست الکترونیکی: J.eshagh@urmia.ac.ir

مقدمه

چراکه انتشار گونه‌های گیاهی در طبیعت بر حسب تصادف نیست، و هر جامعه‌ای خود در برگیرنده مجموعه‌ای از گونه‌های گیاهی با سرشت و نیاز اکولوژیکی مشابه است و متأثر از شرایط محیطی رویشگاه خاصی را برای خود انتخاب می‌کند (۲۱). بنابراین پراکنش جغرافیایی مجموعه گونه‌های گیاهی یک منطقه، نتیجه‌ی تأثیرپذیری آنها از ناحیه یا نواحی رویشی مختلفی است (۱۶). از طرف دیگر شکل زیستی گیاهان علاوه بر وابسته بودن به خصوصیات

شناسایی و معرفی گونه‌های گیاهی یک منطقه در تعیین پتانسیل و قابلیت‌های رویشی رویشگاه، شناسایی گونه‌های مقاوم، در حال انقراض و کمک به حفظ آنها، امکان دسترسی آسان به گونه‌های گیاهی، امکان افزایش تعداد گونه‌ها و استفاده اصولی از آنها اهمیت دارد (۱۹). همچنین بررسی فلوریستیک گونه‌های گیاهی هر منطقه یکی از مؤثرترین روشها جهت شناخت پتانسیل منطقه، مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی موجود محسوب می‌شود (۲).

(۳) در بررسی فلور منطقه آلموت ۶۴۲ گونه و زیرگونه متعلق به ۳۷۳ جنس از ۷۶ تیره گیاهی شناسایی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که این منطقه جزو ناحیه ایران-تورانی است، اما عناصر اروپا - سیبری و صحارا - سندي نیز در آن دیده می‌شود. آکالین اوروشک و همکاران (۲۷) فلور، شکل‌زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه Kırklareli ترکیه را مورد مطالعه قراردادند و ۱۳۱۵ گونه گیاهی متعلق به ۵۰۵ جنس و ۱۱۳ خانواده را شناسایی نمودند. ۳ خانواده Asteraceae، Poaceae و Fabaceae بیشترین فراوانی را در منطقه داشتند.

همچنین سعیدی مهرورز و همکاران (۳۶) فلور جنگلهای عطاکوه، قربانی و همکاران (۱۷) فلور جنگلهای شهرستان نمین، باقرزاده و همکاران (۴) فلور، شکل‌زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان چلپوی کاشمر، عریزی و کشاورزی (۲۹) فلور کوهستان دوپازا در غرب سردشت، قهرمانی نژاد و همکاران (۳۳) فلور پارک ملی ساری‌گل در استان خراسان شمالی، شریفی و همکاران (۳۷) فلور کوه سبلان، دی‌فیو (۳۱) فلور پارک ملی Cilento and Vallo di Diano ایتالیا، بالیوسیس (۳۰) فلور و پوشش گیاهی منطقه Mt Likeo یونان، گنجی (۳۲) فلور، شکل‌زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه گلالی، جعفری و ظرفیان (۹) فلور کوه ساورز در استان کهگیلویه و بویراحمد، بردبار و همکاران (۵) فلور منطقه هنزاکوه از منطقه حفاظت شده بهرآسمان، بشری و همکاران (۶) فلور منطقه حفاظت شده میمند در کهگیلویه و بویراحمد و محمودی و همکاران (۲۳) فلور جنگل کرانزودی دره خان در زاگرس شمالی را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

گونه توس (*Betula pendula* Roth) علاوه بر منطقه شاهروod در جنوب شرقی کوههای البرز، در منطقه مارمیشو در شمال غرب کشور پراکنش دارد (۳۹). بر اساس پیمایش زمینی گونه‌های متعدد چوبی از جمله دارمازو، بنه، بارانک، کیکم، سنجد، بید، گونه‌های متفاوت جنس بادام و زالزالک

ژنتیکی به عوامل محیطی نیز بستگی دارد. بر این اساس گیاهان می‌توانند در اجتماعات مختلف و اقلیم‌های متفاوت از شکل زیستی گوناگونی برخوردار باشند. طیف زیستی غالب در یک اقلیم، معرف چگونگی سازش گیاهان به این اقلیم خاص است. اشکال زیستی گیاهان انعکاسی از سازش آنها با شرایط محیطی به‌ویژه عوامل اقلیمی است (۸).


با توجه به ضرورتهای اشاره شده، پژوهش‌های متعددی در خصوص فلور مناطق مختلف صورت گرفته است که به برخی از جدیدترین پژوهش‌ها در زیر اشاره می‌شود. عادل و همکاران (۱۲) به بررسی فلورستیک جنگلهای کران-رودی در حاشیه رودنخانه صفارود رامسر پرداختند. در این بررسی ۲۶۰ گونه گیاهی متعلق به ۲۲۶ جنس و ۷۷ خانواده شناسایی شد، که خانواده‌های Asteraceae با ۳۰ گونه، Rosaceae با ۱۸ گونه، Lamiaceae با ۱۵ گونه، Fabaceae و Poaceae هر کدام با ۱۴ گونه و Brassicaceae با ۱۱ گونه از بیشترین فراوانی برخوردار بودند. در این بررسی شکل زیستی غالب گیاهان منطقه مربوط به همی‌کریپتوفت‌ها (درصد ۳۸) بوده و گیاهان با منشأ رویشی اروپا- سیبری (درصد ۲۳) بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. کریمی و همکاران (۲۰) فلور منطقه درکش در استان خراسان شمالی را بررسی کردند و ۶۹ گونه گیاهی شامل ۲۰ گونه چوبی (درختی و درختچه-ای) و ۴۹ گونه علفی متعلق به ۳۱ خانواده گیاهی و ۶۷ جنس در این مطالعه شناسایی شدند. همی‌کریپتوفت‌ها با ۳۱ گونه، شکل زیستی غالب گیاهان منطقه را نشان می‌دهد و حدود ۲۹ درصد از گونه‌ها متعلق به ناحیه رویشی ایران-تورانی و حدود ۲۰ درصد متعلق به ناحیه رویشی اروپا- سیبری (عناصر باقیمانده فلور هیرکانی) بودند. پیلهور و همکاران (۷) در مطالعه فلور، شکل زیستی و کوروولوزی جنگل هشتادپهلو، تعداد ۲۱۱ گونه گیاهی را شناسایی نمودند و اظهار داشتند Asteraceae با تعداد ۲۸ گونه، بزرگ‌ترین خانواده در منطقه می‌باشد. اهوازی و همکاران

درجه و ۳۶ دقیقه، تا ۴۴ درجه، ۴۲ دقیقه شرقی قرار دارد. بیشتر نواحی جنگلی در اطراف رودخانه دائمی این منطقه به نام نازلوچای قرار داشته که توپ یکی از گونه‌های درختی مهم این رویشگاه‌ها محسوب می‌شود. این پژوهش در رویشگاه جنگلی منطقه به مساحت تقریبی ۶۰ هکتار انجام شد. ارتفاع از سطح دریا ۱۶۰۰-۱۸۰۰ متر و شیب منطقه ۳۰-۶۰ درصد است. براساس آمار ۲۰ سال اخیر ایستگاه هواشناسی ارومیه (۱۳۷۲-۱۳۹۲)، متوسط بارندگی سالیانه ۳۶۷/۵ میلیمتر می‌باشد. میانگین دما گرمترین ماه سال، ۳۳/۱ درجه سانتی‌گراد، میانگین دما سردترین ماه سال، ۱/۵ درجه سانتی‌گراد است و متوسط روزهای یخ‌بندان در سال ۱۱۹ روز است (۱۰). همچنین براساس منحنی آمبروترومیک طول فصل خشک در منطقه مورد مطالعه تقریباً ۵ ماه و از خرداد تا مهر می‌باشد (شکل ۱).

در کنار گونه ارزشمند توپ در منطقه مارمیشو مشاهده شد. همچنین این رویشگاه علی‌رغم سطح کم از جهت حضور گونه‌های مختلف علفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت بررسی و معرفی فلور ارزشمند این منطقه جهت مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی موجود بسیار مهم و ضروری است. بنابراین این پژوهش باهدف بررسی فلور، تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی رویشگاه توپ در منطقه مارمیشو انجام شده است.

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه: منطقه مارمیشو در ۷۰ کیلومتری شمال‌غربی شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع شده و در عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۳۶ دقیقه شمالی و در طول جغرافیایی ۴۴



شکل ۱- منحنی آمبروترومیک مورد مطالعه

درختچه‌ای و قطعات نمونه ۱۰۰ مترمربعی (10×10 متر) برای جمع‌آوری گونه‌های علفی پیاده شد (۲۳). لازم به ذکر است که در هنگام پیمایش بین نقاط شبکه در صورت برخورد با گونه جدید ثبت نشده در قطعات نمونه، این گونه‌ها نیز جمع‌آوری شدند. برای شناسایی گونه‌های گیاهی، نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده به هریاریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی منتقل

روش تحقیق: نمونه‌برداری در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۳ انجام شد. ۳۰ قطعه نمونه به روش نمونه-برداری منظم تصادفی با ابعاد شبکه 200×100 متر در منطقه مورد مطالعه پیاده شد. فاصله ۱۰۰ متر در جهت شیب در نظر گرفته شد تا بیشترین تغییرات پوشش گیاهی ثبت گردد. در محل تلاقی خطوط شبکه، قطعات نمونه ۴۰۰ مترمربعی (20×20 متر) برای جمع‌آوری گونه‌های درختی و


منطقه شناسایی شدند. این تاکسا به ۱۳۵ جنس و ۴۰ خانواده تعلق دارند. نام علمی، نام فارسی، خانواده، شکل زیستی و کوروتیپ تمام گونه‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه در جدول ۱ درج شده است. از بین ۲۵۱ تاکسون که مربوط به ۵۱ خانواده بودند، خانواده Asteraceae با ۴۰ گونه، خانواده Apiaceae با ۲۲ گونه، خانواده Fabaceae با ۲۱ گونه و خانواده Lamiaceae با ۲۰ گونه، بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی منطقه را به خود اختصاص دادند و خانواده‌های Salicaceae با ۲ گونه، Anacardiaceae با ۱ گونه، Betulaceae با ۱ گونه، Orchidaceae با ۱ گونه از جمله خانواده‌های با کمترین گونه در منطقه می‌باشدند (شکل ۲).

طبقه‌بندی شکل زیستی گیاهان بر اساس روش رانکایر نشان داد که همی‌کریپتوفت‌ها (۱۲۲ گونه، ۴۸/۸ درصد)، تروفیت‌ها با (۵۱ گونه، ۲۰/۴ درصد)، فانروفیت‌ها (۲۸ گونه، ۱۱/۲ درصد)، کریپتوفت‌ها (۳۲ گونه، ۱۲/۸ درصد) و کامفیت‌ها (۱۷ گونه، ۶/۸ درصد) بارزترین شکلهای زیستی گیاهی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند (شکل ۳).


شد (و نگهداری می‌شود) و با استفاده از منابع فلور ایرانیکا (۳۵)، مجموعه فلورهای فارسی ایران (۱) و فلور رنگی ایران (۱۸) مورد شناسایی قرار گرفتند. نامهای علمی گیاهان براساس سایت پلت لیست (۳۸) (http://www.theplantlist.org) به روز رسانی شد و نامهای فارسی گونه‌ها از کتاب فرهنگ نامهای گیاهان ایران (۲۲) استخراج شد. لازم به ذکر است که نمونه‌های گیاهی در هر باریوم مرکز تحقیقات مذکور نگهداری می‌شوند. شکل زیستی گونه‌های گیاهی مختلف براساس طبقه‌بندی شکل‌های زیستی رانکایر (فانروفیت‌ها، کامفیت‌ها، کریپتوفت‌ها، همی‌کریپتوفت و تروفیت‌ها) تعیین شدند (۳۴). سپس کوروتیپ (پراکنش جغرافیایی) گونه‌ها نیز براساس تقسیم‌بندی نواحی رویشی زوهری (۴۰) طبقه‌بندی شدند.

نتایج

به طور کلی در منطقه مورد مطالعه ۲۵۱ تاکسون گیاهی شناسایی شد که از این تعداد ۲۸ گونه جزو گونه‌های چوبی (درختی و درختچه‌ای) متعلق به ۱۱ خانواده می‌باشدند. همچنین تعداد ۲۲۴ گونه علفی و بوته‌ای در




شکل ۲- خانواده‌های گیاهی و تعداد گونه‌ها در هر خانواده در منطقه مورد مطالعه



شکل ۳- فراوانی گونه‌ها در شکل‌های زیستی مختلف در منطقه مورد مطالعه

گونه)، ناحیه رویشی ایران – تورانی، اروپ سیبری و مدیترانه‌ای (IT, ES, Med) با (۳۷ گونه) از مهم‌ترین گروه‌های کورولوژیک موجود در منطقه هستند (شکل ۴).

بررسی پراکنش جغرافیایی رستنیها نشان داد که گونه‌های گیاهی با کورتیپ ناحیه رویشی ایران – تورانی (IT) با (۱۱۵ گونه) در منطقه مورد مطالعه غلبه دارند و ناحیه رویشی ایران – تورانی و اروپا – سیبری (ES, IT) با (۵۹)



شکل ۴- کورتیپ‌های مشاهده شده در مناطق مورد مطالعه (IT: ایران-تورانی، ES: اروپا-سیبری، Med: مدیترانه، PL: چند ناحیه‌ای)

Fabaceae Apiaceae Asteraceae
خانواده‌های آنالوگی آستروئید
Brassicaceae Lamiaceae
نسبت به سایر خانواده‌ها
تعداد بیشتری از گونه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

بحث و نتیجه‌گیری

وجود ۲۵۱ گونه شناسایی شده با ۵۱ خانواده در منطقه مارمیشو نشانگر غنای گونه‌ای بالا در منطقه مارمیشو است.

جدول ۱- فهرست گونه‌های گیاهی منطقه، شکل‌های زیستی، (Ph: فانروفیت، He: همی‌کرپتوفیت، Th: تروفیت، Ch: کامفیت، Cre: ژنوفیت)،
کورتیپ (IT: ایران- تورانی، ES: اروپا- سیبری، Med: مدیترانه، PL: چند ناحیه‌ای) مارمیشو، ارومیه

نام علمی گونه	نام فارسی	فرم رویشی	کورتیپ (پراکنش جغرافیایی)
Acanthaceae <i>Acanthus dioscoridis</i> L.		پای خرس	He IT
Aceraceae			
<i>Acer monspessulanum</i> L. subsp. <i>Cinerascens</i> (Boiss.) Yalt.		کیکم	Ph IT,ES
Amaryllidaceae			
<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	خیارک	Cre	IT,ES
Anacardiaceae			
<i>Pistacia atlantica</i> Desf.	بنه، پسته وحشی	Ph	IT
Apiaceae			
<i>Actinolema macrolema</i> Boiss.	زولک برگدار	Ch	IT
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	جعفری فرنگی خالدار	He	IT
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	جعفری فرنگی غده‌دار	He	IT,ES
<i>Chaerophyllum macropodum</i> Boiss.	جعفری فرنگی کوهستانی، منده	He	IT
<i>Chaerophyllum sp</i>	جعفری فرنگی	He	IT
<i>Chaerophyllum crinitum</i> Boiss.	جعفری فرنگی کرک‌آلد	Cre	IT
<i>Daucus carota</i> L.	هربیج خودروی	He	IT, Med,ES
<i>Eryngium billardierei</i> F. Delaroche	زول	He	IT
<i>Eryngium thyrsoideum</i> Boiss.	زول گرزنی	He	IT
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	قازیاغی	Th	IT, Med,ES
<i>Grammosciadium platycarpum</i> Boiss. & Hausskn.	شوید کوهی	He	IT
<i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	گلپر	He	IT
<i>Hippomarathrum microcarpum</i> (M.B.) B.Fetsch.	رازیانه اسپی	He	IT
<i>Johrenia aromatica</i> Rech.f.	-	He	IT
<i>Pimpinella aurea</i> DC.	جعفری کوهی زرد	He	IT
<i>Pimpinella corymbosa</i> Boiss.	جعفری کوهی	Th	IT
<i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl.	جاشیبر	He	IT,ES
<i>Prangos uloptera</i> DC.	خرکول	He	IT
<i>Scandix stellata</i> Banks & Soland.	شانه و نوس ستاره‌ای	Th	IT, ES
<i>Sium sisarum</i> L.	شقاقل جویباری	Cre	IT, ES
<i>Smyrnium cordifolium</i> Boiss.	آوندول	He	IT
<i>Torilis leptophylla</i> Rchb. f.	ماستونک نازک‌برگ	Th	IT,ES
Aristolochiaceae <i>Aristolochia bottae</i> Jaub. & Spach	زرآوند	He	IT,ES
Asteraceae <i>Achillea filipendulina</i> Lam.	بومادران زاگرسی، بومادران خزری	He	IT,ES

<i>Achillea millefolium</i> L.	بومادران البرزی	He	IT, ES
<i>Achillea vermicularis</i> Thin.	بومادران کوهستانی	He	IT, ES
<i>Anthemis hyalina</i> DC.	بابونه شفاف	Th	IT
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	بابونه زرد	He	IT, ES
<i>Arctium lappa</i> L.	بابا آدم	He	IT, ES
<i>Artemisia absinthium</i> L.	افسنجن	He	IT, ES
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	برنجاسف، درمنه‌ی معمولی	Ch	ES, IT
<i>Carduus arabicus</i> Jacq. ex Murray.	تاتاری عربی	Th	Med, IT
<i>Centaurea behen</i> L.	گل گندم طلایی، بهمن سفید	He	IT
<i>Centaurea persica</i> Boiss.	گل گندم فارسی	He	IT
<i>Centaurea phlomoides</i> Boiss. & Hausskn.	گل گندم	He	IT
<i>Centaurea pseudoscabiosa</i> Boiss & Buhse.	گل گندم طوسکی	He	IT
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	گل گندم زرد	Th	ES, Med
<i>Centaurea virgata</i> Lam.	گل گندم بوته‌ای	He	IT, ES
<i>Centaurea xeranthemoides</i> (Rech.f.)	گل گندم دورودی	Ch	IT
<i>Cephalorrhynchus Brassicifolius</i> (Boiss.)Tuisl	کاهو منقاری برگ کلمی	He	IT
<i>Chardinia orientalis</i> (L.) Kuntze.	-	Th	IT, ES
<i>Chondrilla juncea</i> L.	قندرون	He	IT, ES, Med
<i>Cirsium echinus</i> (M. Bieb.) Sch. Bip.	کنگر کرتی، کنگر شیرازی	He	IT
<i>Cirsium echinus</i> (M. Bieb.) Sch. Bip.	کنگر کرتی، کنگر شیرازی	He	IT
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist.	پیر بهارک کانادایی، پیر بهارک باغ	Th	PL
<i>Echinops orientalis</i> Trautv.	نوعی شکر تیغال	He	IT
<i>Echinops ritrodes</i> Bunge.	شکرتیغال مشهدی	He	IT
<i>Helichrysum oligocephalum</i> DC.	گل بی‌مرگ کم کله	Ch	IT
<i>Helichrysum pallasii</i> (Spreng.) Ledeb.	گل بی‌مرگ تماشایی، گل بی‌مرگ سیبری	Ch	IT
<i>Heteracia szovitsii</i> Fisch. & C.A.Mey.	-	He	IT
<i>Inula britannica</i> L.	مصطفای بریتانیایی	Th	PL
<i>Inula viscidula</i> Boiss&Kotschy	مصطفای چسیناک	He	IT
<i>Lactuca scarioloides</i> Boiss.	کاو چاق‌کن	Th	IT
<i>Lasiopogon muscoides</i> (Desf.)DC.	کاکل پری	Th	IT, ES
<i>Oligochaete divaricata</i> (Fisch. & C.A. Mey.) K. Koch	-	Th	IT
<i>Picris strigosa</i> M.Bieb.	تلخک کرک آلود	He	IT, ES
<i>Scorzonera cinerea</i> Boiss.	شنگ اسپی رگه‌دار	He	IT
<i>Senecio vulgaris</i> L.	پیرگیاه	Th	IT, ES, Med
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	شاه اسفروم	He	IT, ES
<i>Tragopogon caricifolius</i> Boiss.	شنگ نی مانند	He	IT
<i>Tripleurospermum decipiens</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Bornm.	بابونه کاذب فریبا	Th	Med, ES
<i>Tripleurospermum parviflorum</i> (Willd.) Pobed	بابونه کاذب	He	IT, ES

<i>Xeranthemum longepapposum</i> Fisch. & C.A.Mey.	عروس صحرائی	Th	IT,ES
Betulaceae <i>Betula pendula</i> Roth	توس، غان	Ph	ES
Boraginaceae <i>Cerinthe minor</i> L.	علسی	He	IT, ES
<i>Echium italicum</i> L.	گاو زبان ایتالیایی	He	IT
<i>Myosotis lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	فراموش مکن	He	ES
<i>Nonnea persica</i> Boiss.	چشم‌گردی‌های ایرانی	Th	IT
<i>Onosma sericeum</i> Willd.	زنگوله‌ای کرک ابریشمی	He	IT
<i>Symphytum kurdicum</i> Boiss. & Hausskn.	هماور کردی، گوش خر کردی	He	IT
Brassicaceae <i>Aethionema arabicum</i> (L.) Andrz. ex DC.	آتشین	Th	ES,IT, Med
<i>Aethionema grandiflorum</i> Biess.&Hohen.	اتشین	He	IT, ES
<i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex DC	علف سیر	He	PL
<i>Alyssum desertorum</i> Stapf.	قدومه بیابانی	Th	IT, ES
<i>Alyssum heterotrichum</i> Boiss.	قدومه پرسپولیسی	Th	IT
<i>Alyssum lanigerum</i> DC.	قدومه پشمalo	Ch	IT
<i>Alyssum minutum</i> Schltdl. ex DC.	قدومه کوچک	Th	ES,IT, Med
<i>Barbarea minor</i> k. Koch.	ترتیزک جوباری، ترتیزک زمستانی	He	IT
<i>Cardamine uliginosa</i> M.Bieb.	ترتیزک باتلاقی	He	IT, Med
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	ازملک	He	ES,IT, Med
<i>Erysimum</i> sp.	-	He	IT
<i>Erysimum cuspidatum</i> (M.Bieb.) DC.	خاکشیر تاخ	He	ES,Med
<i>Hesperis kurdica</i> F. Dvořák & Hadač var.	شب‌بوی ایرانی	He	IT
<i>Isatis buschiana</i> Schischk.	وسمه ترکیه‌ای	He	IT
<i>Isatis cappadocica</i> Desv. subsp. <i>Cappadocica</i>	وسمه	He	IT
<i>Lepidium latifolium</i> L.	ترتیزک پهن برگی	He	ES,IT, Med
<i>Nasturtium officinale</i> L.R. Br.	بولاغ اوئی، ترتیزک آبی، علف چشممه	Cre	ES,IT, Med
Campanulaceae <i>Asyneuma amplexicaule</i> subsp. <i>aucherii</i> (A.DC.) Bornm.	گل چاک ساقه آغوش	He	IT
<i>Campanula glomerata</i> L.	گل استکانی طناز	He	PL
<i>Campanula phycidocalyx</i> Boiss.&Noe.	گل استکانی ابله دار، گل استکانی کردستانی	He	IT, ES
Caprifoliaceae			
<i>Lonicera nummulariifolia</i> Jaub. & Spach	شن، پلا خور	Ph	IT
<i>Lonicera iberica</i> M.B.	پلانخور بوته‌ای	Ph	IT
Caryophyllaceae <i>Cerastium inflatum</i> Link ex Desf.	دانه مرغ متورم	Th	ES, IT, Med
<i>Dianthus cretaceous</i> (Adam).	میخک گچی	He	IT
<i>Silene conoidea</i> L.	سیلن هرز، گنده قوچی	Th	IT,Med

<i>Silene dichotoma</i> (Ehrh.)	سیلن دوشاخه	Th	IT,ES
<i>Silene prilipkoana</i> (Schischk.)	سیلن نخجوانی	Th	IT,ES
<i>Silene spergulifolia</i> (Willd.)M. Bieb.	سیلن ارمنستانی، سیلن پربرگ	He	IT
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Gärcke.	سیلن بادکنکی	He	IT
Chenopodiaceae <i>Chenopodium foliosum</i> Asch.	سلمک توت گنجشکی	Th	IT, ES
Cistaceae <i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Miller.	گل آفتابی برگ بیدی، دانه گنجشکی	Th	ES, IT, Med
Cucurbitaceae <i>Bryonia multiflora</i> Boiss. & Heldr.	فاسرا	He	IT
Cyperaceae <i>Carex nutans</i> Host.	جگن	Cre	IT
<i>Carex otrubae</i> Podp.	جگن	Cre	ES, IT, Med
Convolvulaceae <i>Convolvulus arvensis</i> L.	پیچک، پیچک صحرابی	He	Pl
Datiscaceae <i>Datysca cannabina</i> L.	شبے شاهدانه، شاهدانه‌وش	He	IT, ES,Med
Dipsacaceae <i>Scabiosa bicolor</i> Kotschy ex Boiss.	طوسک دورنگ	He	IT
Elaeagnaceae <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	سنجد	Ph	IT,Med
Equisetaceae <i>Equisetum arvense</i> L.	دم اسب	Cre	IT, ES
Euphorbiaceae <i>Euphorbia boissieriana</i> (Woronow.) Prokh.	نوعی فرفیون، شیرسگ	He	IT
<i>Euphorbia denticulata</i> Lam.	فرفیون دندانه‌دار	He	IT
<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. & Kit.	فرفیون فرقانی	Th	Pl
Fabaceae(Fabiodae) <i>Astragalus alyssoides</i> Lam.	نوعی گون	He	IT
<i>Astragalus brachycalyx</i> Fisch. ex Boiss.	نوعی گون	Ch	IT
<i>Astragalus caspicus</i> M.Bieb.	نوعی گون	Ch	IT, ES
<i>Astragalus dictyolobus</i> Bung.	نوعی گون	-	IT
<i>Astragalus effusus</i> Bunge.	نوعی گون	He	IT
<i>Astragalus eugenii</i> Grossh.	نوعی گون	Ch	IT
<i>Astragalus glumaceus</i> Boiss.	نوعی گون	Ch	IT(End)
<i>Astragalus ovinus</i> Boiss.	نوعی گون	He	IT
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	خلرزرد	Cre	PL
<i>Lathyrus roseus</i> Steven.	خلر گل سرخی، خلر قرمز	He	IT, ES
<i>Lotus corniculatus</i> L.	آموماش زرد	Th	IT,ES
<i>Lotus gebelia</i> Vent.	آموماش	He	IT
<i>Medicago sativa</i> L.	بونجه	He	IT
<i>Onobrychis altissima</i> Grossh.	اسپرس علوفه‌ای	He	IT,ES

<i>Trifolium arvense</i> L.	شبدر خودروی، شبدر پاخرگوشی	Th	PL
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	شبدر زرد	Th	IT, ES, Med
<i>Trifolium canescens</i> Willd.	شبدر خاکستری	He	IT, ES
<i>Trifolium canescens</i> Willd.	شبدر خاکستری	He	IT, ES
<i>Trifolium pratense</i> L.	شبدر چمن‌زار، شبدر قرمز	He	IT, ES, Med
<i>Vicia variabilis</i> Freyn & Sint. ex Freyn.	ماشک متنوع، ماشک گوناگون	He	IT, ES, SS
<i>Vicia villosa</i> Roth.	ماشک	He	IT, ES, Med
Fagaceae			
<i>Quercus infectoria</i> G.Olivier	دارمازو	Ph	IT
Geraniaceae			
<i>Geranium kotschyi</i> Boiss.	سوزن چوپان	Cre	IT
<i>Geranium tuberosum</i> L.	سوزن چوپان غده دار	Cre	IT, ES, Med
Hypericaceae			
<i>Hypericum helianthemooides</i> (Spach.)Boiss.	گل راعی آفتابی، گل راعی زاگرسی	He	PL
<i>Hypericum perforatum</i> L.	نوعی گل راعی، گل شهناز، هوفاریقون	He	PL
<i>Hypericum scabrum</i> L.	گل راعی دیپجه‌ی	He	IT
Juncaceae			
<i>Juncus heldreichianus</i> T.Marsson ex Parl.	سازو	He	IT, Med
<i>Juncus maritimus</i> Lam.	سازوی دریابی	Cre	ES, Med
Lamiaceae			
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	گزنه‌سای ساقه آغوش	Th	ES
<i>Lamium garganicum</i> L.	گزنه‌سای کوهسری	He	IT, ES
<i>Marrubium parviflorum</i> Fisch. & C. A. Mey.	فراسیون گل ریز	Ch	IT, ES
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson.	پونه	He	IT, ES
<i>Nepeta meyeri</i> Benth.	پونه‌سای آذری	Th	IT
<i>Nepeta transcaucasica</i> Catmint.	-	He	IT
<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	گوش بره	He	IT
<i>Phlomis persica</i> Boiss.	گوش بره ایرانی	He	IT
<i>Salvia atropurpurea</i> Bunge	مریم گی	He	IT
<i>Salvia limbata</i> C. A. Mey.	مریم گلی لبه‌دار	He	IT
<i>Salvia nemorosa</i> L.	مریم گلی مزرعه‌روی	He	IT, ES
<i>Salvia verticillata</i> L.	مریم گلی بنفش	He	IT, ES
<i>Scutellaria condensata</i> subsp. <i>Pycnotricha</i> Rech.f. (Rech.f.)	بسقابای انبوه	He	IT
<i>Stachys iberica</i> M.Bieb.	سنبله‌ای گرجستانی	Ch	IT
<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl.	چای کوهی	Ch	IT, ES
<i>Teucrium polium</i> L.	مریم نخودی	Ch	IT, Med

<i>Thymus kotschyanus</i> Boiss. & Hohen.	آویشن، کهله‌ک اوئى	He	IT
<i>Thymus migricus</i> Klokov & Des. Shost.	آویشن آذربایجانی، کهله‌ک اوئى	Ch	IT, ES
<i>Ziziphora capitata</i> L.	کاکوتى سرسان	Th	IT, ES
Liliaceae			
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	گونه‌ای پیاز	Cre	IT
<i>Allium atroviolaceum</i> Boiss.	گونه‌ای پیاز، تره	Cre	IT
<i>Allium hirtifolium</i> Boiss.	موسیر	Cre	IT
<i>Allium rotundum</i> L.	پیاز سرگرد	Cre	IT, ES
<i>Allium sp.</i>	پیاز	Cre	IT
<i>Colchicum szovitsii</i> Fisch. & C.A.Mey.	گل حسرت، سورنچان	Cre	IT
<i>Muscari caucasicum</i> (Griseb.) Baker.	نوعی کلااغك	Cre	IT
<i>Muscari longipes</i> Boiss.	نوعی کلااغك	Cre	IT
<i>Ornithogalum persicum</i> Hausskn.ex Bornm.	شیرمنغ ایرانی	Cre	IT
<i>Tulipa biflora</i> Pall.	لاله	Cre	IT
Lythraceae			
<i>Lythrum salicaria</i> L.	خون قام	He	PL
Malvaceae			
<i>Alcea digitata</i> Alef.	ختمی پنجه‌ای بریده	He	IT
<i>Alcea tholozani</i> Stapf.	ختمی همدانی	He	IT
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	پنیرک	Th	PL
Oleaceae			
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	زیان گنجشک	Ph	IT, ES
Onagraceae			
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	بید علفی کرکى	Cre	IT, Med, ES
<i>Epilobium montanum</i> L.	بید علفی کوهستانى	Cre	ES
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	بید علفی چهارگوش	Cre	IT
Orchidaceae			
Papaveraceae			
<i>Papaver bracteatum</i> Lindley.	خشخاش طاز، خشخاش كىير	He	IT, ES
<i>Papaver macrostomum</i> Boiss. & Huet ex Boiss.	خشخاش بوشهری، خشخاش بېچم درشت	Th	IT, ES
Plantaginaceae			
<i>Plantago lagopus</i> L.	بارهنگ با گربه‌اي	Th	PL
<i>Plantago lanceolata</i> L.	بارهنگ سرنیزه‌اي، کاردى	He	PL
<i>Plantago major</i> L.	بارهنگ	He	PL
Plumbaginaceae			
<i>Acantholimon sp</i>	كلاه مير حسنه	Ch	IT
Poaceae			
<i>Arrhenatherum kotschyi</i> Boiss.	يولاف پرسپوليسى	Th	IT, ES
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauvois	چمن جاروي جنگللى	He	ES

<i>Bromus danthoniae</i> Trin. ex C. A. Mey.	جارو علفی هرز	Th	IT,ES,Med
<i>Bromus tectorum</i> L.	علف بام، جارو علفی بام	Th	IT,ES,Med
<i>Bromus tomentellus</i> Boiss.	جارو علفی	He	IT
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller.f.)Koeler.	علف نی	He	IT,ES,Med
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	منغ	Cre	ES, IT, Med
<i>Dactylis glomerata</i> L.	علف باغ	He	IT,ES,Med
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	جو پیازدار	Cre	IT,Med
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	نی	He	Pl
<i>Poa bulbosa</i> L.	چمن پیازکدار	Cre	IT,ES,Med
<i>Poa sinica</i> steud.	چمن سینایی	Cre	IT,SS
<i>Poa trivialis</i> var. <i>glabra</i> Döll	چمن معمولی	Th	IT,ES
<i>Secale cereale</i> L	چاودار	Th	IT,ES,Med
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	جاروی رشتی	Th	PL
<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski	گیسو چمن	Th	IT
Polygonaceae			
<i>Polygonum aviculare</i> L.	علف هفت‌بند	Th	PL
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	گزنه آبی	Th	IT, ES
<i>Polygonum hyrcanicum</i> Rech.f.	هفت‌بند خزری	Th	IT
<i>Rheum ribes</i> L.	ریواس	Cre	IT
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	ترشک برگ بلند	He	IT, ES
<i>Rumex tuberosus</i> L.	ترشک غده‌دار	Cre	IT, Med
Ranunculaceae			
<i>Ranunculus constantinopolitanus</i> (DC.) dUrv.	آلهه پشمalo	He	ES, IT, Med
Resedaceae			
<i>Reseda lutea</i> L	ورث	He	IT
Rhamnaceae			
<i>Rhamnus kurdica</i> Boiss. & Hohen.	سیاه تنگرس کردی، داغ آلچوسی	Ph	IT, ES
<i>Rhamnus pallasii</i> Fisch. & C.A. Mey.	سیاه تنگرس، ارجنک	Ph	IT
Rosaceae			
<i>Alchemilla persica</i> Rothm.	پای شیر ابرانی	Cre	IT, ES
<i>Amygdalus kotschyai</i> Boiss. & Hohen. ex Spach	بادام کردستانی	Ph	IT
<i>Amygdalus orientalis</i> Mill.	بادام شرقی، بخورک	Ph	IT
<i>Cerasus microcarpa</i> subsp. <i>microcarpa</i> C.A.Mey.	آلبالوی ریز فراتی	Ph	IT
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.)Miller	محلب	Ph	IT, ES

<i>Cotoneaster hissaricus</i> Pojark.	شیرخشت تاجیک	Ph	IT
<i>Cotoneaster morulus</i> Pojark.	شیرخشت	Ph	IT
<i>Crataegus davisii</i> Browicz	ولیک زالزالک	Ph	IT
<i>Geum urbanum</i> L.	علف مبارک	He	ES, IT, Med
<i>Malus orientalis</i> L.	سیب	Ph	IT
<i>Potentilla recta</i> L.	پنجه‌برگ راست	He	ES, IT, Med
<i>Potentilla reptans</i> L.	پنجه‌برگ راست	He	ES, IT, Med
<i>Pyrus syriaca</i> Boiss.	گلابی وحشی	Ph	ES, IT, Med
<i>Rosa boissieri</i> Crép.	رز سهندی	Ph	IT
<i>Rosa canina</i> L.	نسترن وحشی	Ph	IT, ES
<i>Rosa pulverulenta</i> M. Bieb.	رز‌گردآور	Ph	ES, IT, Med
<i>Rubus caesius</i> L.	تمشك	Ph	IT
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	توت روپاہی	He	ES, IT, Med
<i>Sorbus graeca</i> (Lodd. ex Spach) Lodd. ex S.Schauer	دیو آلبالو	Ph	IT, ES, Med
Rubiaceae			
<i>Crucianella gilanica</i> (Trin.)	شیرپنیر	Ch	IT
<i>Galium humifusum</i> M. Bieb.	شیرپنیر	He	IT, ES, Med
<i>Galium paschale</i> Forssk.	شیرپنیر	He	IT
<i>Galium spurium</i> L.	شیرپنیر	Th	IT, ES, Med
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	شیرپنیر	Th	IT
<i>Galium verum</i> L.	شیرپنیر	He	IT, ES
Salicaceae			
<i>Salix aegyptiaca</i> L.	بیدمشک	Ph	IT
<i>Salix alba</i> L.	بید سفید	Ph	IT, ES
Scrophulariaceae			
<i>Veronica aucheri</i> Boiss.	سیزاب	He	IT
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	گل میمونی	Th	IT
<i>Verbascum cheiranthifolium</i> Boiss	گل ماهور	He	IT, ES
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	گل ماهور تماشابی	He	IT, ES
Tamaricaceae			
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb	گز پرشاخه	Ph	IT, ES
Thymelaeaceae			
<i>Daphne mucronata</i> Royle.	دافنه(تیرو)	Ph	IT
Urticaceae			
<i>Urtica dioica</i> L.	گزنه دو پایه	He	IT, ES, Med
Valerianaceae			
<i>Valerianella uncinata</i> (M.Bieb.) Dufr.	شیرینک قلاب‌دار	Th	IT

دپازا (غرب سردهشت)، بشری و همکاران (۶) در منطقه حفاظت شده میمند، قربانی و همکاران (۱۷) در جنگلهای جنوب‌شرقی شهرستان نمین، کریمی و همکاران (۲۰) در جنگلهای منطقه درکش، سعیدی مهرورز و غیورمند (۱۱) منطقه قره چه در شمال شرق استان خراسان رضوی، احمدی و همکاران (۲۶) در غرب کردستان، نیز به فراوانی بیشتر این شکل زیستی اشاره کردند.

بیشترین سهم گونه‌ها بعد از همی‌کریپتوفتی‌ها به تروفیت‌ها تعلق دارد. سهم زیاد تروفیت‌ها در فلور مناطق خشک و نیمه‌خشک ناشی از سازگاری مطلوب این شکل زیستی به بارندگی فصلی (۱۴) و به علت کوتاه بودن فصل رویش این گیاهان است (۲۴) می‌باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین درصد عناصر شناسایی شده در منطقه (۱۰۰ گونه، ۳۹/۸۴ درصد)، متعلق به ناحیه رویشی ایران تورانی است که با نتایجی که از تحقیقات کریمی و همکاران (۲۰)، مطالعه فلور منطقه درکش در استان خراسان شمالی، عزیزی و کشاورزی (۲۹) در کوهستان دپازا، پیله‌ور و همکاران (۷)، جنگل هشتاد پهلو و عباسی و همکاران (۱۳) منطقه حفاظت شده اشترانکوه به دست آمده مطابقت دارد. عصری و مهرنیا (۱۳۸۱) عنوان نموده‌اند که جنس‌های *Amygdalus*, *Pistacia*, *Silene*, *Anthemis*, *Acantholimon*, *Astragalus*, *Allium*, *Ferula*, *Centaurea*, *Nepeta*, *Echinops*, رویشی درختی، درختچه‌ای و علفی مناطقی با حاکمیت رویشهای ایران-تورانی می‌باشند (۱۵) و این جنس‌ها در منطقه مارمیشو نیز حضور دارند.

هشت گونه از جنس *A. brachycalyx*, *Astragalus* (A. .) (A. *eugenii* Grossh.) Fisch. ex Boiss), (*A. ovinus*, (*A. alyssoides* Lam.) *glumaceus* Boiss), (*A. effusus* Bunge.), (*A. dictyolobus* Bung.) Boiss.) و (A. *caspicus* M Bieb.) در منطقه مطالعه شناسایی

در این مطالعه، خانواده کاسنی Asteraceae در مقایسه با سایر خانواده‌های گیاهی تعداد بیشتری از گونه‌های گیاهی را شامل می‌شود. اعضای این خانواده گیاهی با شرایط اقلیمی منطقه ایران - تورانی سازگاری دارند (۲۵).

از ۲۵۱ تاکسون گیاهی ثبت شده در رویشگاه توپ منطقه مارمیشو، تعداد ۲۸ گونه چوبی (درختی و درختچه‌ای) متعلق به ۱۱ خانواده شناسایی شدند که از میان آنها می‌توان به گونه‌های درختی از جمله، کیکم (Acer), *Quercus infectoria* (monspessulanum L), دارمازو (Pistacia atlantica Desf.), بنه (Oliv.), *Pyrus syriaca* (Sorbus graeca) Spach) و گونه‌های درختچه‌ای مانند شن (Boiss., *Lonicera nummulariifolia* Jaub. and *Cerasus microcarpa* subsp. *microcarpa*) فراتی (Cotoneaster hissarica (C.A.Mey.), شیرخشت تاجیک (Daphne mucronata Royle.), گز (Pojark.), پرشاخه (Tamarix ramossissima Ledeb.), رز گرد آلود (Rosa pulverulenta M. Bieb.) اشاره کرد که از تنوع زیستی گونه‌های چوبی مناسبی برخوردار است. همچنین در این پژوهش ۲۲۳ گونه غیرچوبی شناسایی شد. محمودی و همکاران (۲۳) نیز در بررسی فلورستیک دره خان شهرستان ارومیه ۲۲۱ گونه غیرچوبی را گزارش نمودند. نتایج بررسی شکل زیستی گیاهان منطقه نشان داد که همی‌کریپتوفتی‌ها (۱۲۲ گونه، ۴۸/۸) بیشترین درصد شکل زیستی را به خود اختصاص داده‌اند. می‌توان فراوانی گیاهان همی‌کریپتوفتی را ناشی از سازگاری گیاهان با شرایط اقلیمی سرد و کوهستانی منطقه مورد مطالعه دانست (۲۸).

مطالعات انجام شده توسط اهوازی و همکاران (۳) در منطقه آموت قزوین، عباسی و همکاران (۱۳) منطقه حفاظت شده اشترانکوه، باقرزاده و همکاران (۴) در منطقه چلپوی کاشمر، عزیزی و کشاورزی (۲۹) در کوهستان

که بر اساس داشن بومی منطقه *Convolvulus arvensis* L. مورد استفاده قرار می‌گیرد، لزوم حفظ این منطقه را دوچندان می‌نماید. همچنین از بین تاکسونهای شناسائی شده، گونه‌های متعددی مانند *Rosa canina* L. مشاهده شدند که بواسطه داشتن ظاهری چشم‌ناز و دارا بودن گل‌های زیبا استعداد زیستی‌شدن را دارا می‌باشند، از این‌رو می‌توان آن‌ها را به عنوان گیاه زیستی پرورش داد. درنهایت از آنجاکه گونه توس بسیار محدود در این منطقه و به طور کلی در شمال غرب کشور وجود دارد، لازم است برنامه‌ریزی لازم جهت حفظ و حراست از این گونه و ترکیب گونه‌ای ارزشمند منطقه صورت گیرد.

شد. دراین زمینه کاظمیان و همکاران (۱۳۸۳) عنوان نمودند که گونه‌ها گونه‌های که سازگاری بالایی با شرایط اکولوژیک مناطق کوهستانی دارند (۱۹).

این بررسی نشان داد که رویشگاه توس منطقه مارمیشو دارای غنا و تنوع گونه‌ای قابل توجه‌ای است که به علت مرزی بودن و امنیتی بودن منطقه، غنای گونه‌ای آن دستخوش تغییرات زیادی نشده است. با این حال با توجه به رفع نسبی مشکلات امنیتی منطقه در سالهای اخیر و حضور رو به رشد و بدون برنامه‌ریزی گردشگران و دامداران محلی دراین رویشگاه‌ها می‌تواند زنگ خطری برای کاهش غنای گونه‌ای منطقه باشد. گونه‌های متعدد دارویی از جمله

منابع

۱. اسدی، م.، معصومی، ع. ا.، خاتمساز، م.، و مظفریان، و. ا. (ویراستاران)، ۱۳۷۶-۸۴. فلور ایران، شماره‌های ۱، ۳-۶، ۱۰-۱۳، ۳۳، ۳۶-۴۰، ۴۳، ۴۶-۵۱، ۵۲، ۵۸، ۵۷، ۶۲، ۶۶-۶۹، ۷۱، ۱۳-۱۵ و ۷۴، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.
۲. اکبری‌نیا، م.، زارع، ح.، حسینی، م.، و اجتهادی، ح.، ۱۳۸۳. اکبری‌نیا، م.، زارع، ح.، حسینی، م.، و کورولوژی عناصر گیاهی بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عنصر گیاهی اجتماعات توس در سنگده ساری، پژوهش و سازندگی، شماره ۶، صفحات ۸۴-۹۶.
۳. اهوازی، م.، مظفریان، و.، و چرخچیان، م.، ۱۳۹۴. بررسی فلور منطقه رودبار آلموت، قزوین، ایران. یافته‌های نوین در علوم زیستی، جلد ۲ (۱)، صفحات ۴۸-۶۳.
۴. باقرزاده، ح.، آشوری، ه.، فرجادیان، ع.، و سلیمانی، ا.، ۱۳۹۳. مطالعه فلوریستیک، شکل‌های رویشی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه چله‌پی کاشمر در استان خراسان رضوی، فصلنامه علمی - پژوهشی گیاه و زیست‌بوم، شماره ۴۱، صفحات ۳۲-۱۷.
۵. بردباز، ف.، پاینده، م.، و میرتاج الدینی، م.، ۱۳۹۵. مطالعه فلور منطقه هنزاکوه از منطقه حفاظت شده بهرآسمان، جنوب شرقی ایران، تاکسونومی و بیوسیستماتیک، شماره ۲۸، صفحات ۱۰۰-۷۹.
۶. بشیری، ح.، نقی پور برج، ع.، و نوروزی، م.، ۱۳۹۳. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده و بیوسیستماتیک، شماره ۲۰، صفحات ۸۵-۱۰۲.
۷. پیله‌ور، ب.، کاظمی، س.، و ویس‌کرمی، ز.، ۱۳۹۵. کاربرد توزیع تصادفی قطعات نمونه در مطالعه فلور، شکل زیستی و کورولوژی، مطالعه موردنی: جنگل هشتاد پهلو، نشریه پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، جلد (۲۳)، صفحات ۱۶۱-۱۸۰.
۸. دولتخواهی، م.، عصری، ی.، و دولتخواهی، ع.، ۱۳۹۰. بررسی فلوریستیک منطقه حفاظت شده ارزن-پریشان در استان فارس، مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک، جلد (۳)، صفحات ۳۱-۴۶.
۹. جعفری، ع.، و طریفیان، ا.، ۱۳۹۴. مطالعه فلوریستیک کوه ساورز در استان کهگیلویه و بویراحمد، مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست‌شناسی ایران)، جلد (۲۸)، ۵، صفحات ۹۵۱-۹۲۹.
۱۰. حیدری ریکان، م.، و ملک محمدی، ل.، ۱۳۸۶. گیاهان دارویی دره قاسم‌لوی ارومیه، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۲۲ (۲)، صفحات ۲۵۰-۲۴۴.
۱۱. سعیدی مهرورز، ش.، و غیورمند، م.، ۱۳۹۳. مطالعه فلوریستیک منطقه قره‌چه در شمال شرق استان خراسان رضوی، تاکسونومی و بیوسیستماتیک، شماره ۲۰، صفحات ۸۵-۱۰۲.
۱۲. عادل، م.، پوربابائی، ح.، صالحی، ع.، و علوی، ج.، ۱۳۹۳. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل‌های کرانه‌ودی در

۲۰. کریمی، ل.، مروی مهاجر، م.، نمیرانیان، م.، و ثاقب طالبی، خ.، ۱۳۹۵. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگلهای منطقه درکش در استان خراسان شمالی، مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد ۲(۲)، صفحات ۱۴۳-۱۳۱.
۲۱. متاجی، ا.، و زاهدی‌امیری، ق.، ۱۳۸۵. ارتباط بین گروه‌های اکولوژیک گیاهی و شرایط اداییک رویشگاه (پژوهش موردی در جنگل خیرودکار- نوشهر)، نشریه دانشکده منابع طبیعی، جلد ۴(۴)، صفحات ۵۹-۸۵۳.
۲۲. مظفریان، و.، ۱۳۷۷. فرهنگ نامهای گیاهان ایران، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ۵۹۴ صفحه.
۲۳. محمودی، م.، رمضانی، ا.، اصحابی‌راد، ج.، و حیدری ریکان، م.، ۱۳۹۴. بررسی فلوریستیک جنگل کران‌رودی دره خان در زاگرس شمالی، مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست‌شناسی ایران)، جلد ۲۸(۴)، صفحات ۸۷۶-۸۶۱.
۲۴. نقی‌پور برج، ع.، حیدریان آفاخانی، م.، و توکلی، ح.، ۱۳۸۹. بررسی فلور، شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه سیسیاب در استان خراسان شمالی، فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، شماره ۴، صفحات ۱۲۳-۱۱۳.
۲۵. واعظی، ج.، سخنور، ف.، اجتهادی، ح.، رنجبر، ز.، معماریانی، ف.، و جوهرچی، م.، ۱۳۹۲. فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی، تاکسونومی و بیوسیستماتیک، شماره ۱۶، صفحات ۱۰۰-۸۵.
26. Ahmadi, F., Mansory, F., Maroofi, H., and Karimi, K., 2014. Study of flora, Life form and Chorotypes of the Forest area of West Kurdistan (Iran). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2 (9), PP: 11-18.
27. Akalin urushak, E., Özhatay, F., Guler, N., Ersoy, H., Bashak, N., Yeshil, Y., Oral, D., and Demirci, S., 2013. The flora of Yıldız Mountains (Kırklareli) Biosphere Project area. Turkish Journal of Botany, 37, PP: 225-269.
28. Archibold, O. W., 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman and Hall Inc., London. 509 p.
29. Azizi, H., Keshavarzi, M., 2016. Floristic study of the Dupaza Mountain, Sardasht County, West Azerbaijan Province, NW Iran. *Phytologia Balcanica*, 22(1), PP: 79-84.
30. Baliousis, E., 2013. Flora and vegetation of Mt Likeo (Peloponnisos, Grece). Flora mediteranian, 23, PP: 15-47.
31. De Feo, V., Di Novella, R., Di Novella, N., De Martino, L., and Mancini, E., 2013. Traditional plant use in the National Park of Cilento and Vallo di Diano, Campania, Southern, Italy. Journal of Ethnopharmacology, 145, PP: 328-342.
32. Ganji, E., 2016. Flora, Life Form and Vegetation Structure Geographical Distribution of Plants in Mining in the West of Iran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 6(2), PP: 141-146.
۱۳. عباسی، س.، بهداروند، م.، زارع، ح.، پیله‌ور، ب.، و حسینی، م.، ۱۳۹۴. بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در بخشی از منطقه حفاظت شده اشتارکوه، لرستان. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، شماره ۱، صفحات ۱۳۵-۱۲۵.
۱۴. عصری، ا.، ۱۳۸۷. تنوع گیاهی در پناهگاه حیات‌وحش موته، رستنیها، جلد ۹(۱)، صفحات ۳۷-۲۵.
۱۵. عصری، ا.، و مهرنیا، م.، ۱۳۸۱. معروفی فلور بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سفیدکوه، منابع طبیعی ایران، جلد ۵(۳)، صفحات ۳۷۸-۳۶۳.
۱۶. عصری، ا.، ۱۳۷۷. پوشش گیاهی شوره‌زارهای دریاچه ارومیه، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلهای و مراع، شماره ۱۹۱، صفحه ۲۲۲.
۱۷. فربانی، ا.، تیمورزاده، ع.، و کاویانی‌پور، ا.، ۱۳۹۴. بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان جنگلهای جنوب‌شرقی شهرستان نمین (اسیقران، فندوقلو، حسنی و بویینی) در استان اردبیل، مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست‌شناسی ایران)، جلد ۲(۲۸)، صفحات ۲۷۵-۲۶۴.
۱۸. قهرمان، ا.، ۱۳۷۹-۱۳۵۴. فلور رنگی ایران، جلد ۱-۲۰، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلهای و مراع، تهران.
۱۹. کاظمیان، آ.، تقاضی خادم، ف.، اسدی، م.، و قربانی، م.، ۱۳۸۳. مطالعه فلورستیک بند گلستان و تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه، پژوهش و سازندگی، شماره ۶۴، صفحات ۶۲-۴۸.

33. Ghahremaninejad, F., Ezazi, A., and Rahchamani, N., 2014. The flora of Sarigol National Park, Northern Khorassan Province, Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 4(6), PP: 278-307.
34. Raunkiaer, C., 1934. Life forms of plants (translation). Oxford University Press, Oxford.
35. Rechinger, K. H., (ed.), 1963-2012. Flora Iranica. Vol. 2, 6, 7, 10, 13, 15, 24, 26, 29, 34, 46, 48, 55, 57, 61, 63, 65-70, 75, 77, 90, 96, 120, 123-125, 140, 144, 147, 150, 151, 162. Akademische Druck, U. Verlagsanstalt, Graz.
36. Saeidi Mehrvarz, S., Bazdid Vahdati, F., Naqinezhad, A. R., and Shahi Shavvom, R., 2014. Floristic characteristics of the Hyrcanian submountain forests. Caspian Journal of Environmental Sciences, 12 (2), PP: 169-183.
37. Sharifi, J., Jalili, A., Ghasemov, Sh., Zandi Esfahan, E., 2014. Alpine wetland flora, species life forms and chorology of the Sabalan Mountain-Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5 (2), PP: 173-180.
38. <http://www.theplantlist.org>
39. Zare, H., Akbarinia, M., Hoseini, S. M., Ejtehadi, H., and Amini Eskandari, T., 2010. A new record of *Betula Litwinowii* (Betulaceae) and a review of the geographical distribution of the genus *Betula* L. in Iran. Iranian Journal of botany, 16(2), PP: 237-241.
40. Zohary, M., 1973. Geobotanical foundations of the Middle East. 2vols. Stuttgart. 739 p.

Investigation on flora, life form and chorology of silver birch site in marmisho region- west Azarbaijan

Mahmoodi A.¹, Eshaghi rad J.¹, Alijanpour A.¹ and Heidari Rikan M.²

¹ Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. of Iran

² Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azarbayjan province, Urmia, I.R. of Iran

Abstract

Marmisho region located in 70 km to the northwest of Urmia city is important *Betula pendula* Roth site in Iran and encompasses considerable plant diversity with 60ha area. The study aims to determine the flora, life forms and chorology of the woody and herbaceous plants of silver birch site in the region which is riparian sites with *Quercus*, *Salix* and *Tamarix* species. 30 sample plots were taken using of systematic random sampling method with 100 m× 200 m grid. The 400 m² sample plot was considered to tree and shrub species collection and 100 m² subplot was set up for herb species. The results showed that there were 251 plant species belonging to 51 families in the region in which 28 species were tree and shrub species. The maximum nuber of species belonged to Asteraceae with 40 species, Apiaceae with 22 species, Fabaceae with 21, Lamiaceae with each 20 species and Brassicaceae with 17 species. According to Raunkiaer classification, Hemicryptophytes (122 species), therophytes (51 species) and Phanerophytes (28 species) were the most important life forms. Furthermore, most species belonged to Irano-turanian (115 species), Irano-turanian /Euro-Siberianin (59 species) in the region.

Key words: Marmishoo, silver birch, chorology, Floristic, Life forms