

معرفی فلور، شکل زیستی و کوروولوژی گیاهان منطقه سارال کردستان (زیر حوزه فرهادآباد)

مهتاب گرگین کرجی^{۱*}، پرویز کرمی^۲ و حسین معروفی^۳

^۱ سنتدج، شرکت مهندسین مشاور آمايش سرزمین وطن (آسو)

^۲ سنتدج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری

^۳ سنتدج، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

تاریخ دریافت: ۸۸/۹/۱۲ تاریخ پذیرش: ۹۰/۵/۱۲

چکیده

زیر حوزه فرهادآباد با مساحت ۳۳۱۲ هکتار، در محدوده ۴۶ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۴۷ دقیقه شمالی و ۳۵ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۷ دقیقه شرقی بخشی از منطقه سارال در استان کردستان می‌باشد. بررسی به عمل آمده از فلور منطقه نشان داد تعداد ۲۷۵ گونه از ۳۹ تیره و ۱۷۲ جنس در این منطقه وجود دارد. خانواده‌های Asteraceae، Papilionaceae، Apiaceae، Centaurea، ASTRAGALUS، Salvia و بزرگترین خانواده‌ها و جنس‌های گیاهان به روش رانکایر نشان داد گیاهان همی کریپتوفت ۵۷/۰٪، گیاهان تروفیت ۲۰٪ و گیاهان ژئوفیت پیازدار ۱۰/۱٪ فراوان ترین اشکال زیستی منطقه هستند. پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان دهنده این است که ناحیه ایران - تورانی بیشترین فراوانی (۷۲٪) را به خود اختصاص داده است. ۱۷/۸۱٪ گونه‌ها انحصاری ایران بوده و ۳۴ گونه کمیاب و در معرض خطر (برای ایران) در منطقه وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: فلور، شکل زیستی، کوروولوژی، گونه‌های اندمیک، سارال، کردستان، ایران.

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۸۸۷۸۵۰۵۷، پست الکترونیکی: m.gurjin@gmail.com

مقدمه

فلور غنی و متنوع ایران از دیر باز توسط محققان خارجی و در سالهای اخیر توسط گیاه‌شناسان علاقمند داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. موسوی (۱۳۸۳) در بررسی فلور حوزه آبخیز خانچای طارم زنجان به این نتیجه رسید که ۷۱٪ گیاهان مشاهده شده متعلق به ناحیه ایران - تورانی است. در بین اشکال زیستی نیز به ترتیب همی کریپتوفت ها و تروفیت ها بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند (۱۸). اشرفی و همکاران (۱۳۸۳) در بررسی فلور منطقه ورامین ۲۰۲ گونه گیاهی را مورد شناسایی قرار دادند که گیاهان منطقه ایران - تورانی بیشترین پراکنش را نشان دادند (۳). امیر حسین کاشی پژوه و همکاران (۱۳۸۳) با

پوشش گیاهی در مطالعات آکادمیک به صورت علمی پایه تشریح و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مطالعات کاربردی، پوشش گیاهی به منظور نیل به اطلاعاتی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد (۱۵). به طور کلی شناسایی و معرفی رستنیهای یک منطقه برای دسترسی آسان و سریع به گونه گیاهی خاص در محل و زمان معین، تعیین پتانسیل و قابلیت‌های رویشی منطقه، شناسایی گونه‌های مقاوم و گونه‌های در حال انقراض و کمک به حفظ آنها و کمک به تعیین پوشش گیاهی منطقه اهمیت ویژه ای دارد. (۱۲).

مطالعه فلور جنگلهای شرق دوانگه ساری ۲۳۷ گونه را شناسایی نموده که ۴۶٪ آن را همی کریپتوفت تشکیل داده است^(۱). دولتخواهی و همکاران (۱۳۸۹) در بررسی فلوریستیک تالاب پریشان و اطراف آن ۲۶۹ گونه گیاهی را شناسایی نموده که در بین خانواده‌های گیاهی Asteraceae بزرگترین تیره و تروفیت‌ها در بین شکل‌های زیستی بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند^(۷).


هدف از این تحقیق، بررسی فلور مراتع سارال کردستان و تحلیل آن از لحاظ شکل زیستی، کورولوژی، گونه‌های اندامیک و گونه‌های در معرض خطر می‌باشد.

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه: منطقه مورد مطالعه (زیر حوزه فرهاد آباد) با مساحتی معادل ۳۳۱۲ هکتار، در محدوده ۴۶ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۴۷ دقیقه شمالی و ۳۵ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۷ دقیقه شرقی قرار دارد (شکل ۱). از لحاظ توپوگرافی منطقه کوهستانی است. بلندترین نقطه حوزه در شرق آن با ارتفاع ۲۵۰۰ متر و پست‌ترین نقطه ۲۰۰۰ متر می‌باشد. میانگین بارندگی منطقه ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلی‌متر و میانگین دمای آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. اقلیم منطقه به روش دومارتین گسترش یافته نیمه مرطوب فراسد است.

جمع آوری و محل نگهداری نمونه‌ها: برای انجام این تحقیق، پس از بازدیدهای مکرر صحرایی در مراحل مختلف فولولوژی گیاهان، اقدام به جمع آوری نمونه‌های گیاهی شده به طوری که نمونه‌ها سالم (بدون آفت) و کامل باشند. پس از جمع آوری نمونه‌ها، ضمن یادداشت کردن تاریخ، محل، ارتفاع محل جمع آوری و ویژگی‌های گیاه، نمونه‌ها پرس و خشک شدند که این نمونه‌های خشک شده در هرباریوم مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کردستان نگهداری می‌شوند.


مطالعه فلور منطقه باع شاد دریافتند ۸۵/۲۹ درصد گونه‌ها متعلق به منطقه ایران - تورانی است و در بررسی اشکال زیستی مشخص نمودند که همی کریپتوفت‌ها و تروفیت‌ها فراوان ترین اشکال زیستی منطقه را تشکل می‌دهند (۱۱). کاظمیان و همکاران (۱۳۸۳) در مطالعه فلوریستیک بند گلستان به این نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از گونه‌ها به منطقه ایران - تورانی تعلق دارد و فراوانی همی کریپتوفت‌ها موید شرایط آب و هوایی آن است در حالیکه فراوانی تروفیت‌ها به علت تخریب‌های موجود در منطقه، خشکسالی و کوتاه بودن فصل رویشی است^(۱۲). اکبری نیا و همکاران (۱۳۸۳) با مطالعه فلور اجتماعات توسر سنگده ساری به این نتیجه رسیدند که با توجه به قرار عناصر رویشی ناحیه خزری هستند که با توجه به قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در ناحیه رویشی خزری منطقی به نظر می‌رسد. در بررسی اشکال زیستی مشخص گردید بیشترین درصد به ترتیب متعلق به همی کریپتوفت‌ها و فانروفت‌ها است که معرف وجود اقلیم معتدل می‌باشد (۴). کریمیان (۱۳۸۴) گیاهان منطقه حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق استان یزد را مورد مطالعه قرارداد و ۴۱ گونه گیاهی در معرض خطر را در این منطقه معرفی کرد (۱۳). بتولی (۱۳۸۴) با مطالعه عناصر گیاهی ذخیره‌گاه قزان آن کاشان دریافت که گیاهان متعلق به ناحیه ایران - تورانی بیشترین تعداد عناصر گیاهی منطقه را در بر می‌گیرد؛ همچنین همی کریپتوفت‌ها و تروفیت‌ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند (۶). صفحه خانی و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی فلوریستیک منطقه خان‌گرمز دریافتند اشکال زیستی همی کریپتوفت و تروفیت بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند (۸). ایرانبخش و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی فلور، شکل‌های زیستی و کوروتیپ‌های گیاهان منطقه گرمسار در استان سمنان به این نتیجه رسیدند ۵۵/۹ درصد گونه‌ها متعلق به منطقه ایران تورانی هستند و تروفیت‌ها عمده‌ترین شکل زیستی منطقه گرمسار می‌باشند (۵). آتشگاهی و همکاران (۱۳۸۸) با



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

تعیین شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و گونه های در معرض خطر: برای تعیین شکل زیستی منطقه از رده بندی (۲۲) (۱۹۳۴) Runkiaer استفاده شد. مناطق انتشار گونه ها با استفاده از فلور ایرانیکا، فلور ایران، فلور ترکیه تعیین شد. گونه های در معرض خطر بر اساس معیارهای سازمان International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) مشخص گردید.

شناسایی نمونه های گیاهی: نمونه ها در آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و هریاریوم مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کردستان به کمک ابزار و روش های معمول شناسایی گیاهان و منابع موجود نظری فلور ایرانیکا (۲۳)، فلور رنگی ایران (۱۰)، فلور ایران (۲)، فلور ترکیه (۲۰)، فلور عراق (۲۴)، رستنی های ایران (۱۴)، کروموفیت های ایران (۹)، فرهنگ نامه های گیاهان ایران (۱۶) و گونه های ایران (۱۷) شناسایی و نامگذاری شدند.



شکل ۲- نمودار فراوانی گونه‌های گیاهی متعلق به هر خانواده در منطقه مورد مطالعه.

۸/۷۲ و ۹/۰۹ و ۱۰/۱۸ درصد از کل ۲۷۵ گونه، بزرگترین

تیره‌های گیاهی منطقه هستند (شکل ۲).

جنس‌های گیاهی *Astragalus* (۱۴ گونه)، *Centaurea* (۹ گونه) و *Salvia* (۶ گونه) از بزرگترین جنس‌های منطقه هستند. ۲۵ گونه کمیاب و در معرض خطر در منطقه مورد شناسایی قرار گرفت که در جدول ۱ با علامت * مشخص شده‌اند.

نتایج

بر اساس نتایج حاصل شده تعداد ۲۷۵ گونه از ۳۹ تیره و ۱۷۲ جنس در این منطقه مورد شناسایی قرار گرفتند. *Papilionaceae* (۳۳ گونه)، *Asteraceae* (۳۰ گونه)، *Poaceae* (۲۸ گونه)، *Apiaceae* (۲۵ گونه) و *Lamiaceae* (۱۲ گونه) به ترتیب با داشتن ۱۰/۹، ۱۰/۴ و ۲۴ گونه به ترتیب با داشتن ۱۲، ۱۰/۹، ۱۰/۴ مشخص شده‌اند.

جدول ۱- فهرست اسامی علمی گونه‌ها، شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه مورد مطالعه.

Ph = کامفیت، = فانروفیت، He = همی کرپیتوفت، Th = تروفیت، G.t = ژنوفیت پیازدار، G.b = ژنوفیت تکمه‌ای، G.p = ژنوفیت انگل، G.r = ژنوفیت ساقه زیر زمینی، IT = ایران و تورانی، M = مدیترانه‌ای، ES = اروپا-سیری، End = اندامیک ایران، COSm = جهان‌وطنی، * = کمیاب و در معرض خطر.

ردیف	نام گونه	شماره هرباریومی	شكل زیستی	پراکنش جغرافیایی	نام فارسی
<i>Alliaceae</i>					
1	<i>Allium jesdianum</i> Boiss. & Buhse	۸۱	G.b	IT (End)	پیاز بزدی
2	<i>Allium noeaeum</i> Reut.ex Regel	۷۵۱	G.b	IT	والک سوری
3	<i>Allium saralicum</i> R. M. Fritch*	۹۲۰	G.b	IT	پیاز زاگرسی
4	<i>Allium stipitatum</i> Regel	۴۶۱	G.b	IT	پیاز موسیر
<i>Apiaceae</i>					
5	<i>Bunium cylindricum</i> (Boiss. & Hohen.) Drude	۲۲۴۲	G.t	IT	روغنک، زیره استوانه‌ای
6	<i>Bunium elegans</i> (Fenzl) Freyn	۱۰۲۶	He	IT	زیره زیبا

7	<i>Bupleurum kurdicum</i> Boiss.	۳۲۱۳	He	IT	چتر گندمی کردستانی
8	<i>Chaerophyllum macropodum</i> Boiss.	۱۱۴	He	IT	جعفری فرنگی کوهستانی
9	<i>Chaerophyllum macropermum</i> (Sperng) Fisch. & C.A.Mey.	۴۹۲	He	IT	جعفری فرنگی معطر
10	<i>Eryngium billardieri</i> F. Delarache.	۱۳۶۶	He	IT	نوعی زول
11	<i>Eryngium noeicum</i> Boiss.	۱۷۵۸	He	IT, M, ES	بوقنات
12	<i>Eryngium thyrsoideum</i> Boiss.	۱۵۷۴	He	IT	زول گزنه
13	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	۳۲۶	Th	IT, M, ES	غازیانگی
14	<i>Ferula haussknechtii</i> Wolff ex Rech. f.	۱۲۰۶	He	IT	کمای سازوی
15	<i>Ferulago bernardii</i> Tomek. & M.Pimen.	۶۷۴	He	IT	چوپل آذربایجانی
16	<i>Grammosciadium platycarpum</i> Boiss. & Hausskn.	۹۴۸	He	IT	شوید کوهی
17	<i>Heptaptera anatolica</i> (Boiss.) Tutin	۲۷۱۷	He	IT	
18	<i>Heracleum lasiopetalum</i> Boiss.	۳۳۵۷	He	IT, ES	گلپر کوهستانی
19	<i>Leutea kurdistanica</i> Mozaff.	۲۸۲۹	He	IT (End)	
20	<i>Opsicarpium insignis</i> Mozaff.	۱۸۵۳	He	IT (End)	
21	<i>Peucedanum chenur</i> Mozaff.	۲۹۰۱	He	IT (End)	
22	<i>Pimpinella aurea</i> DC.	۱۱۵۶	He	IT	جعفری کوهی زرد
23	<i>Pimpinella tragium</i> Vill.	۱۲۶۰	He	IT	جعفری کوهی پا کوتاه
24	<i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl.	۵	He	IT, ES	جاشير
25	<i>Prangos uloptera</i> DC.	۱۳۶	He	IT (End)	خرکول
26	<i>Rhabdosciadium aucheri</i> Boiss. *	۱۳۷۰	He	IT (End)	شلیل
27	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	۱۹۹۷	Th	IT	شانه و نوس
28	<i>Scandix stellata</i> Banks & Soland.	۱۱۷۶	Th	IT	شانه و نوس ستاره ای
29	<i>Smyrnopsis aucheri</i> Boiss.	۹	He	IT	پیکل
30	<i>Smyrnium cordifolium</i> Boiss.	۳۴۵	He	IT	آوندول
31	<i>Trigonosciadium brachytaenium</i> (Boiss.) Alava *	۴۵۷	He	IT (End)	گلپرک
32	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	۹۴۷	Th	IT	خار خروسک
Araceae					
33	<i>Arum conophaloides</i> Ky. ex Schott.	۵۰۹۵	He	IT	شیپوری چمچه بخش
34	<i>Arum virescens</i> Stapf.	۳۱۲۶	He	IT	شیپوری چمچه سبز
Asteraceae					
35	<i>Achillea millefolium</i> L. ssp <i>millefolium</i>	۱۰۹۸	He	IT	بومادران هزار برگ
36	<i>Achillea vermicularis</i> Thin.	۱۳۵۹	He	IT	بومادران کوهستانی
37	<i>Anthemis haussknechtii</i> Boiss. & Reut.	۹۴	Th	IT	بابونه زاگرسی

۳۸	<i>Anthemis hyaline</i> DC.	۷۴۵	Th	IT	بابونه شفاف
۳۹	<i>Carduus arabicus</i> Jacx. ex Murray.	۱۵۵	Th	ES , M	تاتاری عربی
۴۰	<i>Centaurea aggregata</i> Fisch. & C.A.Mey. ex DC.	۵۵	He	IT	گل گندم انبوه
۴۱	<i>Centaurea aucheri</i> DC. Wagenz ssp <i>indistincta</i> . Wagenz. *	۱۲۲	He	IT (End)	گل گندم زاگرسی
۴۲	<i>Centaurea behen</i> L.	۸۳۶	He	IT	گل گندم طلابی
۴۳	<i>Centaurea iberica</i> Thev. ex Spreng.	۳۷۱	He	ES , M	گل گندم چمنزار
۴۴	<i>Centaurea leuzeoide</i> (Jaub. & Spach) Walp.	۱۲۹۰	He	IT	گل گندم ارغوانی
۴۵	<i>Centaurea nemecii</i> Nab.	۴۹۸	He	IT	گل گندم سنبله ای
۴۶	<i>Centaurea pseudoscabiosa</i> Boiss & Buhse. *	۴۳۰	He	IT (End)	گل گندم طوسکی
۴۷	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	۱۷۸۵	Th	ES , M	گل گندم زرد
۴۸	<i>Centaurea virgata</i> Lam.	۱۹۵	He	IT	گل گندم بوته ای
۴۹	<i>Chardinia orientalis</i> (L.) O. Kuntze	۱۸۲	Th	IT	
۵۰	<i>Cichorium intybus</i> L.	۱۲۰۲	He	ES , M	کاسنی
۵۱	<i>Cirsium congestum</i> Fisch. & C.A.Mey. ex DC.	۱۵۷۸	He	IT	کنگر انبوه
۵۲	<i>Cirsium haussknechtii</i> Boiss.	۱۱۱۸	He	IT	
۵۳	<i>Cousinia concinna</i> Boiss & Haussk	۱۵۸۳	He	IT (End)	هزار خار با شکوه
۵۴	<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Walp.	۱۷۶	Th	IT, M, ES	سیاه فندق
۵۵	<i>Echinops haussknechtii</i> Boiss. *	۱۶۲۴	He	IT (End)	شکر تیغال کردستانی
۵۶	<i>Gundelia tournefortii</i> L.	۳۷۰	He	IT	کنگر خوراکی
۵۷	<i>Helichrysum oligocephalum</i> DC. *	۱۲۵	Ch	IT (End)	گل بی مرگ کم کپه
۵۸	<i>Onopordon acanthium</i> L.	۱۱۹۶	He	IT	خار زن بابا
۵۹	<i>Picris strigosa</i> M.B.	۸۳۵	He	IT	تلخک کری آلود
۶۰	<i>Scariola orientalis</i> (Boiss) Stojak.	۱۳۷۵	He	IT	گاو چاق کن
۶۱	<i>Scorzonera calyculata</i> Boiss.	۱۱۵۳	G.t	IT	شنگ اسپی پلوری
۶۲	<i>Scorzonera laciniata</i> L.	۱۹۹۰	G.t	ES , M	شنگ اسپی پاره پاره
۶۳	<i>Scorzonera luristanica</i> Rech.F.	۹۲	G.t	IT (End)	شنگ اسپی لرستانی
۶۴	<i>Scorzonera ramossissima</i> DC.	۹۸۵	G.t	IT	شنگ اسپی پر شاخه
۶۵	<i>Tragopogon bornmuelleri</i> Rech.f.	۶۶۷۱	He	IT (End)	شنگ عراقی
۶۶	<i>Tragopogon vaginatus</i> M. Ownbey & Rech.f.	۶۴۴	He	IT	شنگ غلافدار
۶۷	<i>Tripleurospermum disciforme</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Schultz Bip.	۳۱۰۹	He	IT	بابونه کاذب
<i>Boraginaceae</i>					
۶۸	<i>Anchusa italicica</i> Retz.	۳۶۵	He	IT , ES	گاو زبان
۶۹	<i>Cerinthe minor</i> L.	۱۰۴۷	He	ES	عسلی
۷۰	<i>Echium italicum</i> L.	۸۷۲	He	IT	گاو زبان ایتالیایی

71	<i>Heterocaryum szovitsianum</i> (Fisch. & C.A.Mey) A.DC.	۷۴۲۷	Th	IT	
72	<i>Lindelofia kandavanensis</i> Lehm.	۹۴۰۳	He	ES	سگ زبانی
73	<i>Myosotis lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	۳۹۸۷	He	ES	فراموش مکن
74	<i>Nonnea hypoleia</i> Bornm.	۵۳۷۵	Th	IT	چشم گربه‌ای
75	<i>Onosma microcarpum</i> DC.	۲۲۴	He	IT	زنگوله‌ای
76	<i>Rindera lanata</i> (Lam.) Bge.	۷۴	He	IT	
77	<i>Rochelia disperma</i> (L.F.) C.Koch.	۴۲۳۴	Th	IT	چنگکی دو دانه‌ای
78	<i>Solenanthus circinnatus</i> Ledeb.	۱۷۶۱	He	IT	گل عقری
<i>Brassicaceae</i>					
79	<i>Alyssum linifolium</i> Steph.ex Willd.	۲۷۱۵	Th	IT, M	قدومه برگ باریک
80	<i>Brossardia papyracae</i> Bioss. *	۱۸۲۴	He	IT	
81	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	۵۳۳۳	Th	IT, ES	کیسه کشیش
82	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	۱۱۸۷	He	COSm	ازمک
83	<i>Clastopus vestitus</i> Bge .ex Boiss.	۴۰۹	He	IT (End)	
84	<i>Coluteocarpus vesicaria</i> (L.) Holmboe	۲۶۱۵	He	IT	دغدغکی
85	<i>Descurainia Sophia</i> (L.) Schur.	۶۳۹	Th	IT, M, ES	خاکشیر ایرانی
86	<i>Hesperis kurdica</i> Dvorak et Hadac	۷۳۵	He	IT	شب بوی ایرانی کردی
87	<i>Isatis cappadocica</i> Desv. subsp. <i>cappadocica</i>	۴۶۴	He	IT	وسمه
88	<i>Isatis kotschyana</i> Boiss. & Hohen.	۴۱۹	He	IT	وسمه دماوندی
89	<i>Neslia apiculata</i> Fisch. ex Mey.	۵۵۲	Th	IT	آجیل مزرعه
90	<i>Stroganowia persica</i> Busch *	۱۳۱۰	He	IT (End)	تریزیک کوهی
<i>Campanulaceae</i>					
91	<i>Asyneuma amplexicaule</i> ssp <i>aucherii</i> (Willd.) Hand.	۶۴۲	He	IT	گل چاک ساقه آغوش
92	<i>Asyneuma cichoriiforme</i> (Boiss.) Bornm.	۸۹۹	He	M	گل چاک کاسنی شکل
93	<i>Asyneuma persicum</i> (DC)Bornm	۷۲۹	He	IT	گل چاک
94	<i>Campanula ceciliae</i> Rech.f. & Schiman-Czeika	۵۳۶	Th	IT	گل استکانی بلوطستانی
95	<i>Campanula involucrata</i> Auch.ex DC.	۸۸۵	He	IT	گل استکانی برگه دار
<i>Caryophyllaceae</i>					
96	<i>Acanthophyllum microcephalum</i> Boiss.	۱۹۱	Ch	IT	چوبک ایرانی
97	<i>Cerastium dichotomum</i> L.	۱۳۹	Th	IT, M	دانه مرغ دو شانه‌ای
98	<i>Cerastium inflatum</i> Link ex Desf.	۱۴۱	Th	IT, M, ES	دانه مرغ متورم
99	<i>Dianthus orientalis</i> Adams.	۳۵۳	Ch	IT	میخک شرقی گل درشت
100	<i>Gypsophila bicolor</i> (Freyn& Sint.) Grossh.	۱۲۷۶	Th	IT	گچ دوست دورنگ
101	<i>Gypsophila caricifolia</i> Boiss. *	۱۲۸۲	Th	IT (End)	گچ دوست برگ جگنی

102	<i>Silene ampullata</i> Boiss.	۱۵	He	IT	سیلن حبایی
103	<i>Silene chlorifolia</i> Sm.	۴۳۶	He	IT	سیلن برگ سبز
104	<i>Silene commelinifolia</i> Boiss.	۱۲۲۳	He	IT	سیلن دریندی
105	<i>Silene conoidea</i> L.	۵۳۸	Th	IT, M	سیلن
106	<i>Stellaria media</i> (L.) Cyr.	۱۲۴۶	Th	COSm	دانه قناری
107	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medicus <i>Chenopodiaceae</i>	۵۱۲	Th	IT	چنجهنگ
108	<i>Chenopodium album</i> L.	۱۳۳۴	Th	IT, ES	سلمه
	<i>Cistaceae</i>				
109	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Miller	۵۵۸۳	Th	IT, M	گل آفتابی اروپایی
	<i>Crassulaceae</i>				
110	<i>Rosularia sempervivum</i> (M.B.) Berger	۴۵۲۳	He	IT	ناز طوقه‌ای دائمی
	<i>Cyperaceae</i>				
111	<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.	۲۷۳۱	He	COSm	چگن
	<i>Dipsacaceae</i>				
112	<i>Cephalaria microcephala</i> Boiss.	۲۶۹۵	He	IT	سردار سرکوچک
113	<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Roemer & Schultes	۱۱۹۷	Th	M	سردار سر شکافته
114	<i>Pterocephalus canus</i> Coult.ex DC.	۴۳۵	He	IT, M	سربال
115	<i>Scabiosa macrochaete</i> Boiss.& Hausskn. *	۲۴۰	Th	IT (End)	طوسک کردستانی
	<i>Euphorbiaceae</i>				
116	<i>Euphorbia aleppica</i> L.	۴۰۸۸	Th	IT, M	فرفیون سوری
117	<i>Euphorbia denticulate</i> Lam.	۱۰۰۶	He	IT	فرفیون دندانه دار
118	<i>Euphorbia macroclada</i> Boiss.	۸۸۲	He	IT	فرفیون شاخه ضخیم
119	<i>Euphorbia orientalis</i> L.	۹۹۲۳	He	IT	فرفیون شرقی
	<i>Fumariaceae</i>				
120	<i>Corydalis verticillaris</i> DC. ssp <i>verticillaris</i>	۴۴۱	G.b	IT (End)	بهارک فراهم گل درشت
121	<i>Fumaria vailantii</i> Ioisel.	۱۰۷۱	Th	IT (End)	شاه تره ایرانی
	<i>Geraniaceae</i>				
122	<i>Biebersteinia multifida</i> DC.	۳۳۹	G.t	IT	آدمک
123	<i>Geranium tuberosum</i> L.	۱۰۳۸	G.t	IT	سوزن چوبان غده‌دار
	<i>Hypericaceae</i>				
124	<i>Hypericum scabrum</i> L.	۵۰	He	IT	گل راعی دیپهیمی
	<i>Iridaceae</i>				
125	<i>Gladiolus italicus</i> Miller	۶۳۰	G.b	IT, M, ES	گلابیول
126	<i>Gladiolus kotschyanus</i> Boiss.	۲۲۳۲	G.b	IT	گلابیول

127	<i>Iris aucheri</i> (Baker) Sealy	۳۱۸۵	G.b	IT	زنبق
128	<i>Iris hymenopatha</i> ssp <i>leptoneura</i> Mathew & Wendelbo *	۵۸۴۵	G.b	IT (End)	زنبق
129	<i>Iris iberica</i> ssp <i>lycotis</i> (Woron.) Takht. *	۱۲۳۷	G.b	IT (End)	زنبق
130	<i>Iris reticulata</i> Bieb. *	۲۶۷۱	G.b	IT (End)	زنبق
<i>Ixioliraceae</i>					
131	<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	۱۶۰	G.b	IT	خیارک
<i>Juncaceae</i>					
132	<i>Juncus articulatus</i> L.	۶۵۱	He	ES	سازو
133	<i>Juncus inflexus</i> L.	۲۷۱۱	He	IT , ES	سازوی شلاقی
<i>Lamiaceae</i>					
134	<i>Eremostachys laevigata</i> Bunge	۲۴	He	IT	سبل بیابانی پاره برگ
135	<i>Lagocheirus aucheri</i> Boiss. *	۱۲۳۰	Ch	IT (End)	لب خرگوشی
136	<i>Lallemantia iberica</i> (Stev.) Fisch. & C.A.Mey.	۲۱۷	Th	IT	زرده چمن
137	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	۱۷۸	Th	ES	گرنه سای ساقه آغوش
138	<i>Marrubium vulgare</i> L.	۴۲۲	He	IT , ES	فراسیون
139	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson	۴۵	G.r	IT , ES	پونه
140	<i>Nepeta heliotropifolia</i> Lam.	۱۲۹۲	He	IT	پونه‌سای خوش‌نگ
141	<i>Phlomis caucasica</i> Rech.f.	۳۲۶۹	He	IT	گوش بره
142	<i>Phlomis lanceolata</i> Boiss. & Hohen.	۲۰۵	He	IT	گوش بره
143	<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	۱۲۰	He	IT	گوش بره
144	<i>Salvia aristata</i> Aucher ex Benth. *	۷۲	He	IT (End)	مریم گلی
145	<i>Salvia atropurpurea</i> Bunge	۳۷۴	He	IT	مریم گلی
146	<i>Salvia hydrangea</i> DC. ex Benth.	۱۸۳	He	IT	مریم گلی
147	<i>Salvia multicaulis</i> Vahl	۵۸	He	IT	مریم گلی
148	<i>Salvia poculata</i> Nab.	۳۴۱۲	He	IT	مریم گلی
149	<i>Salvia syriaca</i> L.	۲۴۱	He	IT	مریم گلی
150	<i>Scutellaria pinnatifida</i> A.Hamilt.	۳۴۳	He	IT	بشقابی سبله‌ای همدانی
151	<i>Stachys inflata</i> Benth.	۲۰۸	He	IT	سبله‌ای بادکنکی
152	<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl	۲۹۱	He	IT	چای کوهی
153	<i>Thymus fallax</i> Fisch. & C.A. Mey.	۲۷۶۱	Ch	IT	آویشن آناتولی
154	<i>Thymus kotschyanaus</i> Boiss. & Hohen.	۲۹	He	IT (End)	آویشن
155	<i>Ziziphora capitata</i> L.	۳۲۵۱	Th	IT	کاکوتی سرسان
156	<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam. ssp <i>Kurdica</i> Rech. F.	۳۹۷	He	IT (End)	کاکوتی کوهی
157	<i>Ziziphora tenuior</i> L.	۴۴۳۷	Th	IT	کاکوتی


<i>Liliaceae</i>					
158	<i>Bellevalia glauca</i> (Lindl.) Kunth	۲۶۳	G.b	IT	تمشکین برگ آبی
159	<i>Bellevalia longipes</i> Post.	۳۳۶	G.b	IT	تمشکین پابلند
160	<i>Colchicum szovitsii</i> Fisch. & C.A.Mey.	۳۰۷	G.b	IT	گل حسرت، سورنچان
161	<i>Colchicum varians</i> (Freyen & Bornm.) Czernjak.	۱۶۱۸	G.b	IT (End)	گل حسرت
162	<i>Eremurus spectabilis</i> M.B. ssp <i>spectabilis</i>	۱۱	G.b	IT (End)	سرپیش تماشایی سفید
163	<i>Fritillaria crassifolia</i> Boiss. & Huet	۱۳۴۵	G.b	IT	لاله واژگون کردی
164	<i>Fritillaria imperialis</i> L.	۹۱۳	G.b	IT	لاله واژگون ایرانی
165	<i>Fritillaria persica</i> L.	۸۹۱	G.b	IT	لاله واژگون ایرانی
166	<i>Muscari caucasicum</i> (Griseb.) Baker.	۵۹۱	G.b	IT	نوعی کلاغک
167	<i>Muscari longipes</i> Boiss.	۵۴۲۲	G.b	IT	نوعی کلاغک
168	<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch	۲۲۳۹	G.b	COSm	نوعی کلاغک
169	<i>Ornithogalum persicum</i> Hausskn.ex Bornm.	۵۲۲	G.b	IT	شیر مرغ ایرانی
170	<i>Scilla persica</i> Hausskn.	۹۸۶	G.b	IT	نجم آبی
<i>Linaceae</i>					
171	<i>Linum album</i> Boiss.	۱۴۹۶	He	IT (End)	کتان سفید
<i>Onagraceae</i>					
172	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	۲۷۰۹	He	IT, M, ES	
<i>Orchidaceae</i>					
173	<i>Dactylorhiza umbrosa</i> (Kar. & Kir.) Nevski.	۶۶۴	G.t	IT	عله انگشتی سایه پسند
174	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	۱۴۰۴	G.t	IT , ES	ثعلب بتلاقی
<i>Orobanchaceae</i>					
175	<i>Anoplon coccinea</i> (M.B) H.Riedl et Schiman-Czeika	۱۱۷۴	G.p	IT	خون سیاوش
<i>Papaveraceae</i>					
176	<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	۱۹۲۶	He	IT	خشخاش کبیر
177	<i>Papaver fugax</i> Poir.	۲۱۳	He	IT	خشخاش ریزان
<i>Papilionaceae</i>					
178	<i>Astragalus apricus</i> Bunge	۲۶۳۲	He	IT (End)	نوعی گون
179	<i>Astragalus avicennicus</i> Parsa	۵۷۶۴	He	IT (End)	نوعی گون
180	<i>Astragalus carduchorum</i> Boiss.	۴۹۵	Ch	IT (End)	نوعی گون
181	<i>Astragalus chrysostachys</i> Boiss.	۲۴۸۶	Ch	IT	نوعی گون
182	<i>Astragalus curvirostris</i> Boiss.	۱۶۵	Ch	IT (End)	نوعی گون
183	<i>Astragalus echinops</i> Boiss.	۲۲۳۰	He	IT	نوعی گون
184	<i>Astragalus geminanus</i> Boiss. & Hausskn.	۳۹۷۷	Ch	IT (End)	نوعی گون
185	<i>Astragalus macrourus</i> Fischer & C. A. Meyer	۱۵۶	He	IT	نوعی گون

186	<i>Astragalus michauxianus</i> Boiss.	۱۷۰	He	IT	نوعی گون
187	<i>Astragalus nervestipulus</i> Boiss.	۱۰۹	Ch	IT	نوعی گون
188	<i>Astragalus ovinus</i> Boiss.	۲۲۰۶	He	IT (End)	نوعی گون
189	<i>Astragalus pseudorobustus</i> Podlech & Maassoumi	۷۷	He	IT (End)	نوعی گون
190	<i>Astragalus tortuosus</i> DC.	۱۴۸۳	He	IT	نوعی گون
191	<i>Astragalus verus</i> Olivier-Voy.	۵۶	Ch	IT (End)	نوعی گون
192	<i>Cicer anatolicum</i> Alef.	۴۰۴	He	IT	نخود آناتولی
193	<i>Coronilla varia</i> L.	۲۱	Ch	M	پونجه باغی
194	<i>Lathyrus boissieri</i> Sirj	۱۱۲	He	IT	خلر زاگرسی
195	<i>Lathyrus chloranthus</i> Boiss. *	۱۶۹۱	He	IT	خلبرگ درشت
196	<i>Lotus corniculatus</i> L.	۹۳۱	He	COSm	پونجه پاکلاغی
197	<i>Lotus gebelia</i> Vent.	۵۳	He	IT	آهو ماش
198	<i>Medicago radiate</i> L.	۳۸۶	Th	IT	پونجه هلالی
199	<i>Medicago sativa</i> L.	۱۰۳	He	COSm	پونجه
200	<i>Melilotus albus</i> Desr.	۳۵۵۸	He	IT, M, ES	شاه افسر سفید
201	<i>Onobrychis major</i> (Boiss.) Hand-Mzt.	۲۴۹۸	He	IT	اسپرس
202	<i>Ononis spinosa</i> L.	۱۳۵۴	He	IT	خار خر
203	<i>Oxytropis kotschyana</i> Boiss. & Hohen. *	۱۵۶۰	He	IT (End)	گون آسای دماوندی
204	<i>Trifolium angustifolium</i> M.B.	۱۸۲۱	Th	M	شبدر برگ باریک
205	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	۵۷۱	Th	M	شبدر زرد
206	<i>Trifolium repens</i> L.	۵۸۸۵	He	IT	شبدر سفید
207	<i>Vicia variabilis</i> Freyn & Sint.	۱۹۶	Th	IT, ES	ماشک متنوع
<i>Plantaginaceae</i>					
208	<i>Plantago lanceolata</i> L.	۸۹۲	He	COSm	بارهنگ سرنیزه‌ای
<i>Plumbaginaceae</i>					
209	<i>Acantholimon bromifolium</i> Boiss. ssp <i>loloides</i> Rech. F. & Schiman- Czeika *	۵۳۹۲	Ch	IT (End)	کلاه میرحسن کرمانشاهی
210	<i>Acantholimon latifolium</i> Boiss.	۱۶۷۷	Ch	IT	کلاه میرحسن برگ پهن
211	<i>Acantholimon olivieri</i> (Jaub. & Spach) Boiss. *	۱۲۴	Ch	IT (End)	کلاه میرحسن همدانی
<i>Poaceae</i>					
212	<i>Aegilops umbellulata</i> Zhuk.	۳۷۰۰	Th	IT	گندم نیا
213	<i>Agropyron elongatiforme</i> Drobov	۱۷۲۱	He	IT	چمن گندمی بلند
214	<i>Arrhenatherum elatius</i> Beauv	۶۷۲۹	G.b	M	یولافک
215	<i>Bromus danthoniae</i> Thin.	۵۱۵	Th	IT	جارو علفی هرز
216	<i>Bromus sterilis</i> L.	۱۲	Th	IT, M	علف پشمکی عقیم


217	<i>Bromus tectorum</i> L.	۴۱	Th	CO Sm	علف بام
218	<i>Bromus tomentellus</i> Boiss.	۴۳	He	IT	جارو علفی
219	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	۴۸	G.r	M	منغ
220	<i>Dactylis glomerata</i> L.	۳۰	He	IT, M, ES	علف باغ
221	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis	۸۵	He	IT	چاودار وحشی
222	<i>Eremopya persica</i> (Thin.) Roshev.	۵۱۴	Th	IT	گندم پوچو
223	<i>Festuca ovina</i> L.	۱۸	He	IT, M, ES	علف بره
224	<i>Heteranthelium piliferum</i> (Banks & Soland.) Hochst.	۲۷	Th	IT	دگر گل کنندی
225	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	۴۷۱	G.b	IT, M	جوپیاز دار
226	<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	۹۶۱	Th	IT, M	جو هرز
227	<i>Hordeum violaceum</i> Bioss. & Huet.	۲۸۸۹	He	IT	جو بنفش
228	<i>Melica persica</i> Kuntn.	۲۶۵	He	IT, M	ملیکا
229	<i>Poa bulbosa</i> L.	۵۷۹	G.b	IT, M, ES	چمن پیازک دار
230	<i>Poa pratensis</i> L.	۲۷۶	He	IT, M, ES	چمن مرتعی
231	<i>Psathyrostachys fragilis</i> (Boiss.) Nevski	۹۵۳	He	IT	چمن جو
232	<i>Secale montanum</i> Guss.	۹۸۷۴	He	IT, M, ES	چاودار کوهی
233	<i>Stipa parviflora</i> Desf.	۲۷۲۷	He	IT, M	استپی کم گل
234	<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski	۳۵	Th	IT	گیسو چمن
235	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv	۲۴۷	He	IT, ES	شبی یولاف طلایی
236	<i>Zingeria trichopoda</i> (Boiss.) P. Smirn.	۴۲۰	Th	IT	موئین چمن
<i>Polygonaceae</i>					
237	<i>Polygonum alpestre</i> C.A.Mey.	۲۲۸	He	IT	هفت بند کوهستانی
238	<i>Rheum ribes</i> L.	۴۵۹	G.r	IT	ریواس
239	<i>Rumex acetosa</i> L.	۱۴۱۹	He	ES	ترشک باخی
240	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	۸۶۹	He	IT, M, ES	ترشک خوشه ای
241	<i>Rumex scutatus</i> L.	۳۱۹۴	He	IT, ES	ترشک واریزه ای
242	<i>Rumex tuberosus</i> L.	۶۷۵	G.t	IT, M	ترشک غده دار
<i>Ranunculaceae</i>					
243	<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers.	۹۳۹۳	Th	IT, M	گل آفتاب رو
244	<i>Delphinium lanigerum</i> Boiss & Hohen. *	۳۲۹۸	He	IT (End)	زبان در قفای شمالو
245	<i>Ficaria kochii</i> Ledeb.	۱۰۸۲	G.t	IT	فیکاریا
246	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	۶۳۸	Th	IT, M, ES	آلاله صحرایی
247	<i>Ranunculus aucheri</i> Boiss.	۷۶۷۳	G.t	IT	آلاله
248	<i>Ranunculus grandiflorus</i> L.	۳۰۹۷	G.t	ES	آلاله
249	<i>Ranunculus repens</i> L.	۱۶۷	G.t	IT, M, ES	آلاله

۲۵۰	<i>Ranunculus sericeus</i> Banks & Soland.	۱۴۱۵	Th	IT	آلاه کندوانی
۲۵۱	<i>Thalictrum minus</i> L.	۳۵۶۲	He	IT, ES	برگ سدابی
	<i>Rosaceae</i>				
۲۵۲	<i>Amygdalus haussknechtii</i> (C.K. Schneider)	۳۲۷	Ph	IT (End)	بادام زاگرسی
۲۵۳	<i>Cerasus microcarpa</i> (C.A. Mey.) Boiss.	۱۹۸	Ch	IT	آلبالوی دانه ریز
۲۵۴	<i>Sangisorba minor</i> Scop.	۳۷	He	IT, M, ES	توت روپاہی
	<i>Rubiaceae</i>				
۲۵۵	<i>Asperula arvensis</i> L.	۹۴۲	Th	IT, M	زبرینه رایج
۲۵۶	<i>Callipeltis cucullaria</i> (L.) Stev.	۳۴۵۳	He	IT	زیبا سپر
۲۵۷	<i>Cruciata taurica</i> (Pallas ex Willd.) Ehrend.	۷۱۹	He	IT	صلیبی کوهستانی
۲۵۸	<i>Galium verum</i> L.	۴۷	Th	ES	شیر پنیر
	<i>Scrophulariaceae</i>				
۲۵۹	<i>Bungea Thifida</i> C.A. Mey.	۷۶	He	IT	
۲۶۰	<i>Pedicularis sibthorpii</i> Boiss.	۲۴۹۱	He	IT	سبل باتلاقی تیز دندان
۲۶۱	<i>Rhynchocorys elephas</i> ssp <i>carduchorum</i> (L.) Griseb	۱۶۵۹	He	IT	سر فیلی
۲۶۲	<i>Rhynchocorys kurdica</i> Nab.	۱۲۱۲	He	IT	سر فیلی کردی
۲۶۳	<i>Scrophularia nervosa</i> Benth.	۱۲۷۷	He	IT (End)	گل میمونی رگه دار شیرازی
۲۶۴	<i>Scrophularia striata</i> Boiss.	۹۰۰	He	IT	گل میمونی شیار دار
۲۶۵	<i>Scrophularia variegata</i> ssp <i>variegate</i> M.B.	۷۷۳۰	He	IT	گل میمونی رنگارنگ صخره رو
۲۶۶	<i>Verbascum agrimoniiifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor	۱۳۷۸	He	IT	گل ماهور غافشی
۲۶۷	<i>Verbascum phoenicum</i> L.	۲۳۱۴	He	ES	گل ماهور ارغوانی
۲۶۸	<i>Verbascum pseudo-digitalis</i> Nab.	۶۳۱	He	IT (End)	گل ماهور گل انگشتانه ای
۲۶۹	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	۲۸	Th	ES	سیزاب
۲۷۰	<i>Veronica kurdica</i> Benth.	۱۳۲۱	He	IT	سیزاب کردی
	<i>Solanaceae</i>				
۲۷۱	<i>Hyoscyamus kurdicus</i> Bornm.	۲۵۸	He	IT, ES	بذرالبنج
	<i>Urticaceae</i>				
۲۷۲	<i>Urtica dioica</i> L.	۸۳	He	IT, M	گزنه دو پایه
	<i>Valerianaceae</i>				
۲۷۳	<i>Valeriana alliariifolia</i> Adams	۳۸۴	He	IT (End)	والرین علف سیری
۲۷۴	<i>Valeriana sisymbriifolia</i> Vahl	۷۳۱	He	IT	والرین کوهستانی
۲۷۵	<i>Valerianella vesicaria</i> (L.) Moench	۵۱۰	Th	IT, ES	سمنه

طبقه بندی گیاهان در شکل های زیستی مختلف به روش رانکایر نشان می دهد گیاهان همی کرپیتوفت (He) با ۵۷/۰۹ درصد (۱۵۷ گونه)، گیاهان تروفیت (Th) با ۱۰/۱۸ درصد (۲۸ گونه) و گیاهان ژئوفیت پیازدار (G.b) با ۵۵ گونه) فراوانترین اشکال زیستی منطقه را تشکیل می دهند (شکل ۳).



شکل ۳ - نمودار فراوانی اشکال زیستی مشاهده شده در منطقه



شکل ۴ - نمودار فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه.

بحث و نتیجه‌گیری

منطقه مورد مطالعه جزء ناحیه رویشی ایران - تورانی بوده که ۷۲٪ گونه های شناسایی شده در این تحقیق به ناحیه ایران و تورانی تعلق دارد. وجود تعداد ۲۷۵ گونه گیاهی نشانی از غنای گونه های بالا در منطقه می باشد. زهری (۱۹۷۴) مناطق مهم ایران از لحاظ غنای فلورستیک و درصد گونه های انحصاری و نادر را رشته کوه های البرز و زاگرس و برخی کوه های دیگر می داند (۲۵). منطقه مورد مطالعه که بخشی از رشته کوه های زاگرس است را می - توان جزء مناطق با اهمیت دانست، زیرا در برگیرنده درصد بالایی از گونه های انحصاری و کمیاب بوده به طوری که درصد (۴۸ گونه) از مجموع ۲۷۵ گونه شناسایی شده جزء گونه های انحصاری و ۹/۰۹ درصد (۲۵ گونه) جزء گونه های کمیاب می باشد.

پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان دهنده این است که عناصر متعلق به ناحیه ایران - تورانی (IT) با اختصاص ۷۲ درصد (۱۹۸ گونه) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است در حالیکه گونه هایی که متعلق به سه ناحیه ایران - تورانی، مدیترانه ای و اروپا - سیبری (IT و M, ES) هستند، ۶/۱۸ درصد، گیاهان متعلق به دو منطقه ایران و تورانی و اروپا - سیبری (IT و ES) (۵/۴۵ درصد، گیاهان متعلق به دو ناحیه ایران - تورانی و مدیترانه ای (IT و M) ۵/۴۵ درصد، گیاهان متعلق به منطقه اروپا - سیبری (ES) ۳/۶۳ درصد، گیاهان جهان وطن (COSm) ۲/۹ درصد و گیاهان متعلق به دو منطقه مدیترانه ای و اروپا - سیبری (ES و M) ۱/۸۱ درصد را به خود اختصاص داده اند (شکل ۴). از گونه های دیده شده در منطقه، ۱۷/۴۵ درصد (۴ گونه) انحصاری ایران هستند.

تخربی‌های صورت گرفته و خشکسالی داشته است. همچنین حضور زیاد خانواده Asteraceae منعکس کننده وجود تخریب و فشار بر اکوسیستم است که با نتایج دولتخواهی و همکاران (۱۳۸۹) مطابقت دارد.

از بین جنس‌های شناسایی شده در منطقه، جنس Astragalus با ۱۴ گونه دارای بیشترین درصد حضور است. حضور جنس *Astragalus* با اشکال زیستی کاموفیت و همی‌کریپتوفت نشان دهنده شرایط مرتفع سرد و نیمه خشک در منطقه است. صفحه‌خانی (۱۳۸۵) نیز در مطالعه خود به چنین نتیجه‌ای رسیده است. همچنین می‌توان علت حضور زیاد جنس *Astragalus* را سازش آن با مناطق کوهستانی دانست (۱۲).

طبق نظر Archibald (۱۹۵۵) فراوانی گیاهان همی‌کریپتوفت در یک ناحیه نشان دهنده اقلیم کوهستانی سرد است (۱۹). بنابراین می‌توان فراوانی گیاهان همی‌کریپتوفت در منطقه مورد مطالعه را تحت تأثیر این اقلیم دانست. این نتایج با نتایج آتشگاهی و همکاران (۱۳۸۸) مطابقت دارد. با این وجود در منطقه مورد مطالعه تروفیت‌ها از لحاظ فراوانی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند؛ حضور فراوان تروفیت‌ها را می‌توان به تخریب‌های صورت گرفته در منطقه نسبت داد چرا که حضور زیاد دام (چرای مفرط) و رعایت نکردن فصل چرا باعث تخریب و تغییر ترکیب گونه‌های گیاهی شده است. خشکسالی‌های چند سال اخیر مزید بر علت است. کاظمیان و همکاران (۱۳۸۳) نیز در مطالعه خود، حضور تروفیت‌ها را نتیجه

منابع

- ۱- آتشگاهی، ز.، اجتهادی، ح. و زارع، ح.، ۱۳۸۸. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران. مجله زیست‌شناسی ایران. جلد ۲۲ شماره ۲ ص ۱۹۳-۲۰۳.
 - ۲- اسدی، م. (سر ویراستار). ۱۳۶۷-۱۳۹۰. فلور ایران شماره ۱-۷۱. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران.
 - ۳- اشرفی، ک.، اسدی، م. و نجاحی، ر.، ۱۳۸۳. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه ورامین. پژوهش و سازندگی شماره ۶۲-۵۱ ص ۶۲-۶۳.
 - ۴- اکبری نیا، م.، زارع، ح.، حسینی، م. و اجتهادی، ح.، ۱۳۸۳. بررسی فلور، ساختار رویشی و کوروولوژی عناصر گیاهی اجتماعات توس در سنتگده ساری، پژوهش و سازندگی شماره ۶۴-۹۶ ص ۹۶-۸۴.
 - ۵- ایرانبخش، ع.، حمدی، م.م. و اسدی، م.، ۱۳۸۷. معرفی فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ‌های گیاهان منطقه گرمسار در استان سمنان. پژوهش و سازندگی شماره ۷۹ ص ۱۹۹-۱۷۹.
 - ۶- بتولی، ح.، ۱۳۸۴. تنوع زیستی و غنای گونه ای عناصر گیاهی ذخیره‌گاه قرا آن کاشان. پژوهش و سازندگی شماره ۶۸ (۲) ص ۱۰۱-۸۵.
- ۷- دولتخواهی، م.، یوسفی، م. و عصری، ی.، ۱۳۸۹. بررسی فلورستیک تالاب پریشان و اطراف آن در استان فارس. مجله زیست‌شناسی ایران. جلد ۲۳ شماره ۱ ص ۴۶-۳۵.
- ۸- صفحه‌خانی، ک.، رحیمی نژاد، م. و کلوندی، ر.، ۱۳۸۵. بررسی فلورستیک و تعیین اشکال های زیستی گیاهان منطقه حفاظت شده خان گرمز در استان همدان. پژوهش و سازندگی شماره ۷۰. ص ۷۸-۷۰.
- ۹- قهرمان، ا.، ۱۳۷۳-۱۳۷۲. کورموفیتهای ایران، ج ۱-۴. مرکز نشر دانشگاهی.
- ۱۰- قهرمان، ا.، ۱۳۷۹-۱۳۸۶. فلور رنگی ایران ج ۱-۲۶. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۱- کاشی پزها، ا.ح.، عصری، ی. و مرادی ح. ر.، ۱۳۸۳. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه باغ شاد. پژوهش و سازندگی شماره ۶۳ ص ۹۳-۱۰۱.
- ۱۲- کاظمیان، آ.، تقاضی خادم، ف.، اسدی، م. و قربانی، م.، ۱۳۸۳. مطالعه فلورستیک بند گلستان و تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه. پژوهش و سازندگی شماره ۶۴. ص ۶۱-۴۸.

- ۱۶- مظفریان، و. ا.، ۱۳۷۷. فرهنگ نامهای ایران. انتشارات فرهنگ معاصر. ۵۹۴ صفحه.
- ۱۷- معصومی، ع. ا.، ۱۳۶۵-۱۳۷۴. گونهای ایران جلد ۴. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
- ۱۸- موسوی، ا.، ۱۳۸۳. معرفی فلور و عناصر رویشی حوزه آبخیز خانچای در طارم علیای زنجان. منابع طبیعی ایران شماره ۵۷ (۳). ص ۵۵۱-۵۶۳
- 19- Archibold, O. W. 1995. Ecology of word vegetation. Chapman and Hall INC., London. pp 509
- 20- Davis, P.H. 1965-1988. Flora of Turkey vols 1- 10 .Edinburgh university Press England.
- 21- Jalili,A&Jamzad,Z.1999.Red data book of Iran. Research institute of forests and rangelands
- 22- Runkiaer, C. 1934. The life forms of plant and statistical plant geography. Clarendon Press. Oxford. pp328.
- ۱۳- کریمیان، ع. ا.، ۱۳۸۴. گیاهان دارویی، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق استان یزد. محیط شناسی. شماره ۳۷. ص ۷۷-۸۸
- ۱۴- میین، ص. ۱۳۷۵. رستنیهای ایران. ج ۱-۴. دانشگاه تهران.
- ۱۵- مصدقی، م.، ۱۳۸۰. توصیف و تحلیل پوشش گیاهی. جهاد دانشگاهی مشهد. ۲۸۷ صفحه.
- 23- Rechinger, K.H.1963-1986. Flora Iranica vols 1- 171. Akademische Druck. u. Verlagsanstalt, Graz-Austria.
- 24- Townsend,C.C & Guest, E. 1960-1985. Flora of Iraq vols 1-9. Minstry of Agriculture and agriarian reform. Baghdad.
- 25- Zohary, M. 1974. Geobotanical foundation of the middle east. 2 vol. Gustav Fisher verlg. Stuttgart.

Introduction to the flora, life forms and chorology of Saral of Kurdistan (Case study sub catchment Farhadabad)

Gurgin Karaji M.¹, Karami P.² and Marofii H.³

¹ Mohandesin Moshaver Amayesh Sarzamin Vatan (ASO), Sanandaj, I.R. of Iran

²Rnage and watershed management Dept., University of Kurdistan, Sanandaj, I.R. of Iran

³Research center of agriculture and natural resources of Kurdistan provincece, Sanandaj, I.R. of Iran

Abstract

The Saral region is located in Kurdistan province in Iran. Farhadabad sub catchment is a part of Saral rangelands with 3312 hectares area. Its geographical position is 46° 44' N to 46° 47' and 35° 31' E to 35° 37'. Flora of these rangelands includes 275 plant species which belong to 39 families and 172 genera. The largest families are *Asteraceae* (33 species), *Papilionaceae* (30 species), *Apiaceae* (28 species). The most important genera are *Astragalus* (14 species), *Centaurea* (9 species) and *Salvia* (6 species) respectively. The main life form of plant species includes hemichryptophytes 57.09%, Therophytes 20% and Bulbygeophytes 10.18%. Investigation on chorology of plant species showed that 72 percent of species belong to Irano_Touranian region and other species can be found in other regions too. The number of endemic plants of Iran are 49 species (17.81%), and the number of endangered species are 34 in Saral region.

Key words: flora, life forms, chorology, Endemic species, Saral, Kurdistan, Iran.