

## تأثیر محلول‌پاشی روی و نانوذره روی بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و ترکیبات اسانس

## ریحان سبز

احمد آقایی<sup>۱\*</sup>، صالح شهابی‌وند<sup>۱\*</sup>، معصومه اطهاری<sup>۱</sup> و یوسف نصیری<sup>۲</sup><sup>۱</sup> ایران، دانشگاه مراغه، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی<sup>۲</sup> ایران، دانشگاه مراغه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

## چکیده

روی به عنوان یک عنصر ریزمغذی ضروری، نقش مهمی در رشد و متابولیسم گیاه بر عهده دارد. این مطالعه، به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی برگی روی بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی ریحان در شرایط گلخانه‌ای انجام گرفت. تیمارها شامل چهار سطح اکسید روی (۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) و چهار سطح نانوذره اکسید روی (۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد برگی روی تأثیر معنی‌داری ( $P \leq 0.05$ ) بر صفات مورد اندازه‌گیری داشته است. تیمار اکسید روی و نانوذره روی باعث افزایش معنی‌دار در طول کل گیاه (ارتفاع بوته + طول ریشه)، وزن تر و خشک گیاه، تعداد برگ در بوته، میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و درصد اسانس ریحان شد و از این نظر نقش نانوذره روی مؤثرتر از اکسید روی بود. بیشترین مقدار شاخص‌های رشدی و میزان رنگیزه‌ها در سطح ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذره روی مشاهده شد. بر اساس نتایج، ۳۴ ترکیب در اسانس ریحان شناسایی شد که بیشترین آنها مربوط به مونوترپن‌های اکسیژن‌دار بوده و سه متابولیت اصلی اسانس شامل متیل چاویکول، لینالول و آلفاکادینول بودند. همچنین بیشترین مقدار متیل چاویکول و آلفاکادینول در سطح ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذره روی مشاهده شد. روی احتمالاً با افزایش هورمون‌های رشد، بهبود جذب برخی عناصر غذایی و افزایش سنتز پیش‌سازهای متابولیت‌های ثانویه توانسته است باعث افزایش رشد و تولید اسانس در گیاه ریحان شود. یافته‌های این تحقیق نشان داد که تأثیر نانوذره روی در افزایش رشد و مواد مؤثره گیاه ریحان، مؤثرتر از کود اکسیدروی است.

واژه‌های کلیدی: اسانس ریحان، اکسید روی، محلول‌پاشی، نانوذره روی

\* نویسندگان مسئول، تلفن: ۰۴۱۳۷۲۷۶۰۶۸، پست الکترونیکی: [aghaee2001@yahoo.com](mailto:aghaee2001@yahoo.com); [shahabi70@yahoo.com](mailto:shahabi70@yahoo.com)

## مقدمه

نیستند ولی معمولاً نسبت به داروهای سنتزی در صنعت داروسازی، عوارض کمتری دارند و حتی در بسیاری از موارد ممکن است به دلیل داشتن خواص آنتی‌اکسیدانی، سمیت داروهای دیگر را کاهش دهند (۱۹). امروزه ترکیبات شناسایی شده در گیاهان به عنوان داروهای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به عنوان کلیدی برای شناسایی روش‌های درمانی کم‌هزینه و دارای عوارض

گیاهان دارویی از گیاهان اقتصادی مورد استفاده بشر می‌باشند که مواد شیمیایی موثر و مفیدی را با مقادیر بسیار کم در خود ذخیره می‌کنند (۱). از اواسط قرن بیستم به بعد و به دنبال مشخص شدن عوارض سوء ناشی از استعمال داروهای شیمیایی مختلف، گیاهان دارویی و داروهای مستخرج از گیاه در بسیاری از موارد جایگزین داروهای شیمیایی شده‌اند. اگرچه این گیاهان نیز عاری از عوارض

شرایط خاک که معمولاً منجر به کمبود روی در گیاهان می‌شود شامل pH خاک بالا، مواد آلی کم و رطوبت کم خاک است (۹). محلول‌پاشی عناصر غذایی یک رویکرد جهت استفاده بهینه از کودها و همچنین اثربخشی آنها تحت شرایط نامساعد محیطی است (۳۵). شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده از محلول‌پاشی روی که از طریق آوندهای آبکش و با سرعت انجام می‌گیرد، روش بسیار موثر و عملی برای به حداکثر رساندن جذب و تجمع روی است (۱۴).

به طور کلی موادی که حداقل در یک بعد دارای اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشند، به عنوان مواد نانو طبقه‌بندی می‌شوند. مهمترین کاربرد فناوری نانو در کشاورزی در زمینه کودهای نانو است که می‌تواند گیاهان را به تدریج و به صورت کنترل شده تغذیه کند، برعکس آنچه در مورد کودهای معمولی اتفاق می‌افتد. کودهای نانو احتمالاً می‌توانند کارایی بیشتری داشته و آلودگی خاک و سایر خطرات زیست محیطی را که ممکن است هنگام استفاده از کودهای شیمیایی رخ دهد، کاهش دهند (۲۶). یکی از مزایای استفاده از کودهای نانو این است که کاربرد آنها را می‌توان در مقادیر کمتری نسبت به استفاده از کودهای معمولی انجام داد (۲۶). اثرات مثبت نانوذره اکسید روی بر جوانه‌زنی دانه، ویگور (نیرومندی) دانه‌رست، محتوای کلروفیل برگ و رشد ساقه و ریشه در بادام‌زمینی، گندم و هویج مشاهده شده است (۸، ۲۸، ۳۴).

گزارش‌های کمی مبنی بر مقایسه اثر محلول‌پاشی روی معمولی و نانوذره روی بر ویژگی‌های گیاه ریحان وجود دارد، لذا این مطالعه به بررسی اثر اکسید روی معمولی و نانوذره روی بر برخی شاخص‌های رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و مواد فیتوشیمیایی گیاه دارویی ریحان در شرایط گلخانه‌ای می‌پردازد.

جانمی کمتر در درمان بسیاری از بیماری‌ها به کار روند (۱۲). نیاز روزافزون صنعت داروسازی به ماده اولیه دارویی، اهمیت کشت و فرآوری گیاهان دارویی و معطر را به شدت افزایش داده است (۱۶).

گیاه ریحان (*Ocimum basilicum* L.) از خانواده نعنائیان (Lamiaceae) از گذشته‌های دور به عنوان دارو برای درمان امراض گوناگون مانند سردرد، سرفه، اسهال، کرم‌ها و سوء عملکرد کلیه مطرح بوده است. اسانس آن حاوی ترپنوئیدهای بیولوژیکی فعال است که دارای خواص دفع حشرات، نامتادکشی، ضد باکتریایی و ضد قارچی است (۳۳). این گیاه دارای مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنلی به ویژه اسید رزمارینیک بوده که دارای خواص ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی قوی است (۲۱). ریحان یکی از گیاهان بومی ایران است که در بسیاری از نقاط کشور کاشته می‌شود و به دلیل اهمیت جهانی آن، در بسیاری از مناطق جهان کشت می‌شود (۳۷). طبق مطالعات انجام شده، اسانس این گیاه و به خصوص ترکیبات فنیل پروپانوییدی آن به عنوان ترکیبات اصلی دارویی این گیاه شناخته شده‌اند (۱). ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده اسانس‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع خاک، آب و هوا، ارتفاع از سطح دریا، فصل و ساعت نمونه‌برداری، نوع و مقدار عناصر غذایی خاک و میزان آب موجود می‌تواند متفاوت باشد (۳۶). بدین صورت که یک‌گونه گیاهی در شرایط مختلف محیطی می‌تواند اسانس‌هایی با ترکیبات مؤثره مختلف با فعالیت دارویی گوناگون را تولید کند (۱۰).

عنصر روی یکی از مهم‌ترین ریزمغذی‌های مورد نیاز برای رشد و تولید گیاهی است. روی نقش مهمی در فعالیت‌های فتوسنتزی برگ در گیاهان دارد و برای تقسیم سلولی، بیوسنتز کلروفیل، متابولیسم اکسین، تولید میوه و عملکرد دانه‌گرده عنصری ضروری است (۳۲). کمبود روی به عنوان شایع‌ترین کمبود عناصر کم‌مصرف در کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه شناخته شده است.

## مواد و روشها

درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. بعد از ۴۰ روز از کاشت، اولین مرحله محلول‌پاشی انجام گرفت سپس هر ۱۵ روز یکبار محلول‌پاشی و در کل سه مرتبه انجام گرفت و ۱۵ روز بعد از مرحله آخر محلول‌پاشی برداشت نمونه‌های گیاهی انجام گرفت. گیاهان شاهد، با مقادیر مساوی از آب مقطر در زمان‌های ذکر شده، محلول پاشی شدند. به‌طور تصادفی از هر واحد آزمایشی ۳ گیاه برداشت گردید. سپس طول کل گیاه (مجموع ارتفاع بوته به اضافه طول ریشه)، وزن تر کل گیاه (وزن تر اندام هوایی + وزن تر ریشه) و تعداد برگ در هر بوته، محاسبه شدند. وزن تر گیاه برای کلیه تیمارها با استفاده از ترازوی حساس با دقت ۰/۰۱ گرم اندازه‌گیری گردید. نمونه‌های ریشه و قسمت هوایی به مدت یک هفته در دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد در سایه خشک گردید سپس اجزای گیاهی به درون پاکت‌های کاغذی که قبلاً وزن شده بود منتقل گردید تا وزن خشک کل گیاه (وزن خشک اندام هوایی + وزن خشک ریشه) تعیین شود.

به‌منظور سنجش کلروفیل از استون ۸۰ درصد استفاده گردید از هر نمونه مقدار ۰/۵ گرم در هاون چینی قرار داده و با مقدار ۴ میلی‌لیتر استون کاملاً ساییده شد، سپس محلول را در فالدکون‌هایی که به‌وسیله فویل کاملاً پوشانده شده بودند تا در معرض نور قرار نگیرند ریخته و به مدت ۵ دقیقه در ۴ درجه سانتی‌گراد و تعداد ۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ گردید و سپس از لایه رویی به وسیله سمپلر برداشته در میکروتیوب‌ها که آن‌ها هم به‌وسیله فویل پوشانده شده‌اند ریخته شد و پس از صفر کردن دستگاه اسپکتروفتومتر، در کووت، ۸۰۰ میکرولیتر استون و ۵۰ میکرولیتر از عصاره به‌دست‌آمده ریخته و در طول موج ۴۷۰ کاروتنوئیدها و طول موج‌های ۶۶۴ و ۶۴۶، کلروفیل a و کلروفیل b قرائت گردید (۱۱).

جهت استخراج اسانس از دستگاه کلونجر و روش تقطیر با آب استفاده شد. اسانس‌گیری به مدت سه ساعت انجام شد

این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه مراغه انجام گرفت. تیمارها شامل تیمار اکسید روی در چهار سطح (۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) و تیمار نانوذره اکسید روی در چهار سطح (۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) بودند. بذور ریحان (تهیه شده از آزمایشگاه باغبانی دانشگاه مراغه) ابتدا به مدت ۵ دقیقه با هیپوکلریت سدیم ۵٪ درصد به همراه چند قطره توتین ۲۰ ضدعفونی شد و سپس بذور چند بار با آب مقطر استریل شستشو داده شدند. برای جوانه‌زنی، کاغذ صافی را درون پتری‌دیش‌های ۸ سانتی‌متری قرار داده و ۳۰ بذور درون هر پتری‌دیش قرار گرفت و ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر به هر پتری اضافه شد. نمونه‌های خاک از محوطه دانشگاه تهیه گردید. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک (با بافت شنی-لومی) به صورت: شن ۶۸٪، سیلت ۲۵٪، رس ۷٪، ماده آلی ۱/۴۸٪، روی ۱/۹ میلی‌گرم بر کیلوگرم، نیتروژن کل ۰/۱۳٪، فسفر ۳۱/۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم، پتاسیم ۲۵۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم، pH ۷/۵ و EC ۰/۷ dS/m بود. در این آزمایش گلدان‌هایی با قطر دهانه ۲۵ و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر را با ۷ کیلوگرم خاک پر کرده و سپس در هر گلدان ۸ عدد بذور ریحان کشت شد و در گلخانه با دمای روزانه و شبانه به ترتیب  $28 \pm 2$  و  $18 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۰ الی ۷۰ درصد قرار گرفتند. پس از کاشت بذرها ابتدا هر گلدان با ۴۰۰ سی‌سی آب مقطر و در ادامه هر دو روز یکبار با ۴۰۰ سی‌سی آب مقطر آبیاری گردید. محلول‌های اکسید روی و نانوذره اکسید روی (تهیه شده از آزمایشگاه شیمی دانشگاه مراغه با اندازه حدود ۸۰ نانومتر، خلوص بالای ۹۹ درصد و چگالی ۵/۶ گرم بر سانتی‌متر مکعب) در غلظت‌های ۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر تهیه شدند. برای افزایش حلالیت اکسیدهای فلزی در آب، سوسپانسیون‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در دستگاه التراسونیک (۱۰۰ وات) و دمای ۴۵

کل گیاه (وزن خشک اندام هوایی + وزن خشک ریشه)، محلول‌پاشی اکسید روی در سطح ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و محلول‌پاشی نانوذره روی در هر سه سطح (۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) باعث تغییر مثبت معنی‌دار بر این شاخص رشدی نسبت به شاهد شد (شکل ۱-ج). تعداد برگ در بوته تحت تاثیر تیمار ۱۰۰ اکسید روی و سطوح ۵۰ و ۱۰۰ نانوذره، نسبت به گیاهان شاهد، افزایش معنی‌دار حاصل کرد (شکل ۱-د).

در مورد همه شاخص‌های رشدی شامل طول کل گیاه، وزن تر کل گیاه، وزن خشک کل گیاه و تعداد برگ در بوته، با افزایش غلظت هر دو تیمار (اکسید روی و نانوذره روی)، میزان شاخص رشدی نیز افزایش یافته است و نیز کمترین و بیشترین میزان همه شاخص‌های رشدی به ترتیب در گیاهان شاهد و سطح ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذره مشاهده شد (شکل ۱-الف تا ۱-د). همچنین در هر سطح تیمار، افزایش شاخص رشدی تحت تیمار نانوذره بیشتر از تیمار اکسید روی در همان سطح بود (شکل ۱-الف تا ۱-د).

اطلاعات درج شده در شکل ۲ (الف تا د) نشان داد که غلظت رنگیزهای فتوسنتزی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. میزان کلروفیل *a* و مجموع کلروفیل *a+b* تحت تاثیر دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ اکسید روی و نیز سه سطح ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ نانوذره روی، نسبت به شاهد بطور معنی‌دار بیشتر شدند (شکل ۲-الف). کاربرد برگی اکسید روی و نانوذره روی در هر سه سطح باعث افزایش معنی‌دار در میزان کلروفیل *b* و کارتنوئیدهای برگ در مقایسه با گیاهان شاهد شد (شکل ۱-ب تا ۲-د). در مورد همه رنگیزه‌های فتوسنتزی، بیشترین مقدار رنگیزه در سطح ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذره روی دیده شد. در مورد هر رنگیزه فتوسنتزی و در مقایسه تیمار اکسید روی با تیمار نانوذره روی در هر سطح مورد مطالعه، تیمار نانوذره، مقادیر بیشتری نسبت به تیمار اکسید روی داشت (شکل ۲-الف تا

و اسانس‌های استخراج شده با سولفات سدیم خشک آبگیری و داخل ویال شیشه‌ای در مکان تاریک و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد تا زمان آنالیز نگهداری گردیدند. برای شناسایی ترکیب‌های اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل شده به طیف‌سنجی جرمی (GC-MS) مدل Agilent 5977A ساخت کشور آمریکا، با ستون HP-5 MS (۵ درصد فنیل متیل پلی سیلوکسان، به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت ماده جاذب ۰/۲۵ میکرومتر) استفاده شد. دمای ستون از ۵۰ درجه سانتی‌گراد شروع و در نهایت به ۲۵۰ درجه رسید. به عنوان گاز حامل از هلیوم با درجه خلوص ۹۹/۹٪ و میزان جریان ۱ میلی‌لیتر در دقیقه استفاده شد. انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت بود. برنامه حرارتی در دامنه ۶۰ تا ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۳ درجه بر دقیقه و دمای محفظه تزریق ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد بود. شناسایی ترکیبات بر اساس زمان بازداری (RT) و جرم ثبت شده آنها انجام گرفت (۲۰).

این تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با نرم افزار SPSS انجام شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون توکی در سطح احتمال ۵ درصد ( $P \leq 0.05$ ) استفاده گردید. نمودارها توسط نرم‌افزار Excel رسم شدند.

## نتایج


یافته‌های مشخص شده در شکل ۱-الف نشان داد که تیمار برگی اکسید روی در سطح ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و تیمار برگی نانوذره روی در هر سه سطح ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر باعث افزایش معنی‌دار ( $P \leq 0.05$ ) در طول کل گیاه (طول ریشه + طول اندام هوایی) در مقایسه با گیاهان شاهد شد. نتایج (شکل ۱-ب) نشان داد که کاربرد اکسید روی در سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و کاربرد نانوذره روی در همه سطوح مورد مطالعه، وزن تر کل گیاه (وزن تر اندام هوایی + وزن تر ریشه) را بطور معنی‌دار نسبت به شاهد افزایش داد. در مورد شاخص وزن خشک

۲-د).

شد (شکل ۳). ترکیبات شیمیایی اسانس گیاهان ریحان تحت تیمارهای مختلف اکسید روی و نانوذرات اکسید روی (به صورت محلول‌پاشی برگ‌گی) در جدول ۱ ارائه شده است. آنالیزهای انجام شده با دستگاه GC-MS حضور ۳۴ ترکیب را در اسانس گیاهان تمامی تیمارها نشان داد.

درصد کل ترکیبات شناسایی شده در اسانس تیمارها از ۹۳/۳۹۵ تا ۹۸/۷۷۸ درصد متغیر بود. بیشترین ترکیبات مربوط به مونوترپن‌ها (۷۱/۶ تا ۷۹/۱ درصد) و سزکوئی‌ترپن‌ها (۱۳/۷ تا ۲۳/۹ درصد) بودند.





درصد اسانس گیاه ریحان تحت تیمارهای مختلف در شکل ۳ نشان داده شده است. یافته‌ها نشان داد کاربرد برگ‌گی اکسید روی در دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و کاربرد نانوذره روی در همه سطوح باعث افزایش معنی‌دار در درصد اسانس در مقایسه با ریحان‌های شاهد شد (شکل ۳). با افزایش سطح تیمار اکسید روی و نانوذره روی، درصد اسانس نیز افزایش حاصل کرد و بیشترین کمترین مقدار درصد اسانس به ترتیب در گیاهان تیمار شده با ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذره و گیاهان شاهد ثبت



شکل ۱- اثر محلول‌پاشی اکسید روی معمولی و نانوذره اکسید روی بر شاخص‌های رشدی گیاه ریحان شامل طول کل گیاه (الف)، وزن تر کل گیاه (ب)، وزن خشک کل گیاه (ج) و تعداد برگ در بوته (د). حروف متفاوت روی ستون‌ها نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال ۵ درصد است.

جدول ۱- درصد ترکیبات اسانس گیاهان ریحان تیمار شده با غلظت‌های مختلف اکسید روی و نانوذره اکسید روی


ترکیبات	RT	شاهد	اکسید روی (۲۵ میلی‌گرم بر لیتر)	اکسید روی (۵۰ میلی‌گرم بر لیتر)	اکسید روی (۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر)	نانوذره روی (۲۵ میلی‌گرم بر لیتر)	نانوذره روی (۵۰ میلی‌گرم بر لیتر)	نانوذره روی (۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر)
$\alpha$ -Pinene	۱۷/۱۹۴	۰/۰۸۸	۰/۰۳۵	۰/۱۲۰	۰/۰۴۹	۰/۰۳۶	۰/۰۴۱	۰/۱۰۴
Sabinene	۱۹/۱۹۲	۰/۰۸۰	۰/۰۴۱	۰/۰۸۴	۰/۰۹۴	۰/۰۴۸	۰/۰۴۴	۰/۰۸۴
$\beta$ -Pinene	۱۹/۵۸۸	۰/۱۹۲	۰/۰۴۲	۰/۱۹۸	۰/۱۱۵	۰/۱۰۳	۰/۰۴۰	۰/۲۰۷
$\beta$ -Myrcene	۱۹/۷۸۰	۰/۹۲۱	۰/۷۸۳	۰/۹۲۷	۰/۵۶۵	۰/۳۳۸	۰/۴۲۵	۰/۶۴۱
1,8-Cineole	۲۲/۱۴۴	۰/۶۵۵	۰/۴۵۵	۰/۶۴۳	۰/۴۶۰	۰/۲۷۹	۰/۳۲۵	۰/۵۷۲
$\beta$ -(Z)-Ocimene	۲۲/۳۹۹	۲/۸۰۱	۱/۰۷۵	۱/۸۸۸	۱/۸۹۶	۱/۵۰۶	۱/۱۲۴	۲/۵۴۳
B-(E)-Ocimene	۲۲/۷۵۴	۱/۸۹۷	۱/۰۹۳	۱/۹۲۳	۱/۳۰۳	۱/۱۹۸	۰/۷۷۲	۱/۳۵۰
Fenchone	۲۵/۰۳۵	۰/۱۵۹	۰/۱۵۳	۰/۲۳۱	۰/۱۶۳	۰/۱۳۷	۰/۳۶۶	۰/۱۴۸
Linalool	۲۵/۵۹۷	۱۳/۹۳۳	۹/۰۵۱	۱۰/۸۴۷	۹/۹۶۴	۱۳/۵۳۱	۸/۸۸۳	۱۲/۱۴۴
Borneol	۲۸/۵۳۱	۱/۲۹۷	۱/۱۸۸	۱/۳۸۸	۱/۴۳۱	۱/۲۵۷	۰/۹۸۹	۱/۳۴۱
$\alpha$ -Terpineol	۲۹/۶۹۷	۰/۱۷۲	۰/۲۰۹	۰/۲۹۶	۰/۳۱۸	۰/۲۰۶	۰/۱۷۱	۰/۴۰۶
Methyl Chavicol	۳۰/۸۸۷	۵۶/۲۸۰	۵۹/۴۵۹	۵۳/۰۶۷	۶۰/۶۹۰	۵۳/۴۰۴	۶۱/۱۸۸	۵۹/۶۱۷
$\alpha$ -Copaene	۳۷/۸۸۹	۰/۳۷۱	۰/۱۶۵	۰/۱۸۷	۰/۰۷۲	۱/۶۸۸	۰/۲۸۳	۰/۰۴۷
$\beta$ -Cubebene	۳۹/۰۶۹	۰/۰۹۵	۰/۱۴۹	۰/۱۳۶	۰/۱۲۹	۰/۱۱۲	۰/۱۲۱	۰/۰۹۴
$\beta$ -Elemene	۳۹/۵۳۸	۱/۱۱۳	۱/۵۷۱	۱/۳۵۹	۱/۰۰۱	۱/۴۵۶	۱/۸۷۸	۰/۷۸۱
Methyl Eugenol	۳۹/۷۵۱	۱/۰۵۷	۰/۲۸۷	۰/۸۴۹	۰/۳۸۵	۱/۲۳۲	۰/۶۸۰	۰/۳۵۰
$\beta$ -Caryophyllene	۴۱/۱۴۵	۰/۷۵۷	۲/۰۶۴	۲/۰۲۰	۰/۸۷۱	۰/۹۳۰	۰/۷۸۴	۰/۷۱۰
$\alpha$ -Bergamotene	۴۱/۳۲۷	۱/۱۲۲	۱/۵۲۶	۱/۸۳۳	۱/۵۶۱	۱/۳۴۴	۲/۰۵۸	۱/۰۲۹
$\alpha$ -Guaiene	۴۱/۵۶۶	۰/۴۷۷	۰/۷۰۶	۰/۵۸۰	۰/۴۸۵	۰/۶۱۲	۰/۸۵۱	۰/۳۶۵
Naphthalene	۴۱/۸۲۸	۰/۶۱۷	۰/۷۲۶	۰/۷۹۴	۱/۱۴۴	۰/۵۱۸	۰/۵۰۳	۰/۵۲۴
$\alpha$ -Humulene	۴۲/۶۷۴	۰/۴۲۷	۰/۵۵۰	۰/۶۶۷	۰/۵۲۶	۰/۴۱۳	۰/۶۱۹	۰/۳۶۱
$\beta$ -Farnesene	۴۲/۸۷۹	۰/۳۱۱	۰/۴۰۸	۰/۴۳۳	۰/۳۵۹	۰/۲۸۲	۰/۴۱۴	۰/۲۳۷
Germacrene D	۴۳/۶۸۷	۱/۲۳۷	۲/۰۱۸	۱/۷۴۳	۱/۶۲۹	۰/۰۹۹	۱/۹۰۹	۱/۰۴۴
Bicyclogermacrene	۴۴/۰۹۹	۰/۳۱۸	۰/۳۳۴	۰/۴۱۴	۰/۲۹۸	۱/۷۳۶	۰/۴۸۶	۰/۲۰۲
Germacrene A	۴۴/۳۰۱	۰/۶۰۷	۰/۹۲۵	۰/۶۳۶	۰/۶۴۲	۰/۶۵۸	۱/۱۹۱	۰/۴۶۴
$\alpha$ -Bulnesene	۴۴/۴۳۰	۰/۶۹۷	۱/۰۵۱	۰/۸۲۱	۰/۶۵۶	۰/۸۳۰	۱/۲۹۸	۰/۵۱۲
$\alpha$ -Farnesene	۴۴/۹۱۵	۱/۴۷۴	۲/۱۲۱	۲/۲۱۹	۱/۷۹۷	۱/۵۲۶	۱/۸۵۰	۱/۳۰۳
$\delta$ -Cadinene	۴۵/۶۲۱	۰/۱۱۲	۰/۱۳۷	۰/۱۲۱	۰/۱۱۲	۰/۱۰۴	۰/۱۵۷	۰/۱۵۸
Nerolidol	۴۶/۳۲۷	۰/۱۹۸	۰/۱۷۴	۰/۲۰۲	۰/۱۹۶	۰/۱۸۱	۰/۲۵۶	۰/۱۷۲
Spathulenol	۴۷/۶۴۹	۰/۴۵۵	۰/۳۲۵	۰/۳۹۱	۰/۲۷۹	۰/۴۸۳	۰/۶۶۹	۰/۴۲۱
Caryophyllene Oxide	۴۹/۰۵۹	۰/۷۱۴	۰/۸۵۹	۰/۸۶۰	۰/۷۹۶	۰/۸۸۵	۰/۹۳۲	۰/۶۷۱
$\alpha$ -Cadinol	۵۰/۰۳۴	۵/۱۴۴	۵/۸۴۹	۵/۹۷۰	۵/۵۹۸	۵/۸۴۴	۶/۹۲۸	۴/۳۹۴
$\beta$ -Eudesmol	۵۰/۵۵۳	۰/۲۲۳	۰/۲۶۵	۰/۳۰۴	۰/۲۶۳	۰/۳۴۵	۰/۳۰۶	۰/۲۹۹
$\alpha$ -Bisabolol	۵۱/۴۹۷	۰/۲۱۶	۰/۱۷۱	۰/۱۹۰	۰/۲۱۶	۰/۲۶۸	۰/۲۳۸	۰/۲۰۰
کل (%)	۹۶/۲۱۸	۹۵/۹۶۳	۹۶/۳۴۴	۹۶/۰۶۳	۹۳/۵۸۹	۹۸/۷۷۸	۹۳/۳۹۵	
مونوترپن‌ها (%)	۷۸/۴۷۵	۷۳/۵۸۴	۷۱/۶۱۲	۷۷/۰۴۸	۷۲/۰۴۳	۷۴/۳۶۸	۷۹/۱۵۷	
سزکوئی‌ترین‌ها (%)	۱۷/۱۲۶	۲۱/۶۵۳	۲۱/۹۳۸	۱۷/۸۷۱	۲۱/۰۲۸	۲۳/۹۰۷	۱۳/۷۱۴	
مونوترپن‌های هیدروکربنی (%)	۵/۹۷۹	۳/۰۶۹	۵/۱۴۰	۴/۰۲۲	۳/۲۲۹	۲/۴۴۶	۴/۹۲۹	
مونوترپن‌های اکسیژن‌دار (%)	۷۲/۴۹۶	۷۰/۵۱۵	۶۶/۴۷۲	۷۳/۰۲۶	۶۸/۸۱۴	۷۱/۹۲۲	۷۴/۲۲۸	
سزکوئی‌ترین‌های هیدروکربنی (%)	۵/۱۸۳	۱۳/۷۲۵	۱۳/۱۶۹	۱۰/۱۳۸	۱۱/۷۹۰	۱۳/۸۹۹	۷/۲۰۷	
سزکوئی‌ترین‌های اکسیژن‌دار (%)	۱۱/۹۴۳	۷/۹۲۸	۸/۷۶۹	۷/۷۳۳	۹/۲۳۸	۱۰/۰۰۸	۶/۵۰۷	
محتوای اسانس (%)								



شکل ۲- اثر محلول پاشی اکسید روی معمولی و نانوذره اکسید روی در سطوح مختلف بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه ریحان شامل کلروفیل a (الف)، کلروفیل b (ب)، مجموع کلروفیل a+b (ج) و کاروتنوئیدها (د). حروف متفاوت روی ستون‌ها نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال ۵ درصد است.

شکل ۳- اثر محلول پاشی اکسید روی معمولی و نانوذره اکسید روی در سطوح مختلف بر درصد اسانس گیاه ریحان. حروف متفاوت روی ستون‌ها نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال ۵ درصد است.

همچنین مونوترپن‌های اکسیژن‌دار (۶۶/۴ تا ۷۴/۲ درصد) و سپس سزکوئی‌ترین‌های اکسیژن‌دار (۶/۵ تا ۱۱/۹ درصد) مقادیر بیشتر نسبت به بقیه‌ترین‌ها داشتند. ترکیبات غالب در اسانس نمونه‌های بررسی شده شامل متیل چاویکول (۵۳/۰۶۷ تا ۶۱/۱۸۸ درصد)، لینالول (از ۸/۸۸۳ تا ۱۳/۹۳۳



گاز گربنیک محلول در سیتوپلاسم سلول‌های پارانشیم برگ می‌شود و منجر به افزایش کربوهیدرات‌ها می‌گردد، بنابراین به طور غیرمستقیم افزایش رشد گیاه را به همراه دارد (۲۲). همچنین می‌توان چنین بیان داشت که روی در تقسیم میتوز نیز نقش دارد و احتمالاً افزایش ویژگی‌های ریخت‌شناختی مانند تعداد برگ می‌تواند مرتبط با این موضوع باشد (۳۰). افزایش وزن خشک گیاه با مصرف روی را به موارد متفاوت از قبیل افزایش بیوستز اکسین در حضور عنصر روی، افزایش آنزیم کربونیک آنهیدراز که در همه بافت‌های فتوسنتزی حضور دارد و برای بیوستز کلروفیل مورد نیاز است، بهبود عملکرد فتوسیستم‌های نوری، افزایش فعالیت فسفوانیول پیرووات کربوکسیلاز و ریبولوز فسفات کربوکسیلاز و افزایش جذب نیتروژن و فسفر در حضور عنصر روی مرتبط می‌دانند (۵).

در این تحقیق کاربرد نانوذره اکسید روی در همه سطوح آن باعث افزایش در صفات رشدی مورد مطالعه یعنی طول گیاه، وزن تر و خشک کل گیاه و تعداد برگ در بوته به طور معنی‌دار شد و اثر نانوذره در هر سطح نسبت به اثر اکسید روی در همان سطح، روی پارامترهای رشدی بیشتر بود (شکل ۱-الف تا ۱-د). در آزمایش مشابه، محلول‌پاشی اکسید روی به فرم معمول سبب افزایش ۹ درصدی و محلول‌پاشی اکسید روی به فرم نانوذرات موجب افزایش ۲۴ درصدی در وزن خشک اندام هوایی در رقم‌های ذرت شد (۳). در تحقیقی دیگر، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه گیاه قهوه تحت تاثیر محلول‌پاشی نانوذره اکسید روی افزایش چشمگیری نشان داد در حالیکه تاثیر تیمار برگی سولفات روی بر پارامترهای رشدی مذکور به مراتب در مقایسه با نانوذره کمتر بود (۲۷). تاثیر رشدی و فیزیولوژیکی مختلف بین نانوذره اکسید روی و اکسید روی معمولی را می‌توان به انتشار آهسته یون روی ( $Zn^{2+}$ ) از نانوذرات روی نسبت داد. هر چند که نانوذرات روی با قدرت انحلال بالا شناخته شده‌اند، اما مطالعه قبلی حاکی از آن بود که انحلال نانوذرات روی در آب نسبتاً کند است و

درصد) و آلفا-کادینول (از ۴/۳۹۴ تا ۶/۹۲۸ درصد) بودند. سایر ترکیبات اغلب مقادیری کمتر از ۲ درصد را دارا بودند.

تیمارهای اکسید روی و نانوذرات اکسید روی در غلظت‌های مختلف موجب تغییرات معنی‌دار ( $P \leq 0.05$ ) در محتوای سه ترکیب اصلی متیل چاویکول، لینالول و آلفا-کادینول شدند. بیشترین و کمترین میزان متیل چاویکول به ترتیب در گیاهان تیمار شده با نانوذرات اکسید روی ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر (۶۱/۱۸۸ درصد) و اکسید روی ۵۰ میلی‌گرم (۵۳/۰۶۷ درصد) بدست آمد. در مورد میزان لینالول، بیشترین و کمترین مقادیر به ترتیب در گیاهان شاهد (۱۳/۹۳۳ درصد) و محلول‌پاشی شده با نانوذرات اکسید روی ۵۰ میلی‌گرم (۸/۸۸۳ درصد) مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان آلفا-کادینول نیز به ترتیب در تیمارهای نانوذرات اکسید روی ۵۰ میلی‌گرم (۶/۹۲۸ درصد) و نانوذرات اکسید روی ۱۰۰ میلی‌گرم (۴/۳۹۴ درصد) بدست آمد.

## بحث

در مطالعه حاضر محلول‌پاشی برگی اکسید روی در اکثر سطوح به خصوص در سطح ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، باعث افزایش پارامترهای رشدی شامل طول کل گیاه (طول اندام هوایی + طول ریشه)، وزن تر کل گیاه (وزن تر اندام هوایی + وزن تر ریشه)، وزن خشک کل گیاه (وزن خشک اندام هوایی + وزن خشک ریشه) و تعداد برگ در بوته شد. همچنین مشاهده شد که روند یکنواختی بین صفات ارتفاع گیاه با وزن تر و خشک گیاه و نیز تعداد برگ در بوته، با افزایش سطح تیمار وجود دارد. در مطالعات قبلی اثر مثبت ریز مغذی روی بر افزایش صفات رشدی در گیاهان مختلف مشخص شده است. در آزمایش مشابه کاربرد برگی اکسید روی باعث افزایش وزن خشک دو رقم ذرت در شرایط بدون تنش و نیز تحت تنش شوری شد (۳). عنصر روی با تاثیر بر آنزیم کربونیک آنهیدراز سبب افزایش

نانونوذر کلات روی در افزایش محتوای اسانس ریحان بیشتر از سولفات روی و کلات روی بود و همچنین با افزایش مقدار روی بکار رفته، محتوای اسانس نیز افزایش یافت (۴). با توجه به نقش عنصر روی در فتوسنتز و متابولیسم قندها و نیز با عنایت به اینکه قندها (گلوکز) مهمترین منابع کربن و انرژی مورد استفاده در بیوسنتز اسانس (ترپن‌ها) هستند، از این‌رو نقش فراهمی روی در تولید و تجمع اسانس حائز اهمیت است. از طرف دیگر، نانونوذرات به دلیل جذب بیشتر توسط گیاه (۲)، اثرگذاری بیشتری نسبت به ذرات معمولی دارند و این می‌تواند مؤثرتر بودن نانونوذر روی (با افزایش سطح آن) را نسبت به اکسید روی، توجیه کند.

ترکیبات غالب اسانس در گیاه ریحان در مطالعه حاضر و در گیاهان شاهد و تیمار شده با روی در غلظت‌های مختلف آن، شامل ترپن‌های اکسیژن‌دار و در بین آنها سه ماده متیل چاویکول، لینالول و آلفا کادینول بود، هر چند که میزان نسبی آنها در تیمارهای مختلف، متفاوت بود. در دو واریته از ریحان که از مزارع محلی در ایران جمع‌آوری شده بودند، بیشترین مقدار اسانس به ترتیب مربوط به متیل چاویکول و لینالول بود (۲۷). حنیف و همکاران (۱۷) نشان دادند که در اسانس ریحان ترکیبات مهم و اساسی از نوع مونوترپن‌های اکسیژن‌دار هستند و در بین آنها متیل چاویکول یا استراگول متابولیت مهم با مقدار بالایی را شامل می‌شود. همچنین در مطالعه دیگر، بیشترین مقدار اسانس در ریحان، متابولیت ثانویه متیل چاویکول بود و آلفا کادینول از ترکیباتی بود که مقدار بالایی را در بین ترکیبات ثانویه نشان داد (۳۹).

نتایج جدول ۱ نشان داد که کاربرد برگی روی (اکسید روی و نانونوذر روی) در غلظت‌های مختلف بر میزان ترکیبات اسانس ریحان مؤثر بوده است. Dehabadi و همکاران (۱۵) مشاهده کردند که محتوای کل مونوترپن‌های اسانس *Mentha spicata* با استفاده از تیمار روی افزایش می‌یابد

تنها حدود ۲٪ روی در عرض ۲۴ ساعت از نانونوذر آزاد شد (۲۹). از آنجا که محلول حاوی نانونوذر روی در هر کاربرد برگی به صورت تازه تهیه شد، انتظار نمی‌رود که انحلال آن زیاد باشد. با این حال، پس از اتصال نانونوذرات به سطح برگ‌های ریحان، یون روی ممکن است به طور مداوم آزاد شود و منبع طولانی مدتی از روی را فراهم کند. نتایج شکل ۲ (الف تا د) نشان داد که هر دو تیمار آزمایشی در غلظت‌های مورد نظر تاثیر مثبتی بر میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، کلروفیل b و کارتنوئیدها در گیاه دارویی ریحان داشتند و تاثیر مثبت نانونوذر اکسید روی در هر سطح مورد مطالعه، نسبت به اکسید روی معمولی در افزایش میزان رنگیزه‌ها بیشتر بوده است. اثر افزایشی عنصر روی به فرم معمولی و نانونوذر بر میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی در گیاهان مختلف در شرایط بدون تنش و نیز در شرایط تنش مشخص شده است (۱۳، ۴۰). کاربرد نانونوذر روی در سطوح ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، باعث افزایش قابل توجه در میزان کلروفیل کل و کارتنوئیدهای هویج وحشی شد (۳۴). فلز روی با دخالت در تنظیم غلظت‌های سیتوپلاسمی آهن و منیزیم، در بیوسنتز کلروفیل و کارتنوئیدها نقش مهمی را ایفا می‌کند (۵). در ضمن روی می‌تواند با به تعویق انداختن تخریب و پیری سلولی به صورت غیرمستقیم بر میزان کلروفیل تاثیر داشته باشد (۲۵). از طرف دیگر با توجه به نقش روی در تحریک بیوسنتز پروتئین و آنزیم‌های مختلف، می‌توان گفت روی بعنوان کوفاکتور آنزیم‌ها نقش مهمی در تجمع پیگمان‌های رنگی به خصوص کلروفیل و کارتنوئیدها دارد.

مشخص شده که عوامل محیطی و استرس‌زا می‌تواند ترکیب شیمیایی و اسانس گیاهان مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق درصد اسانس تحت تاثیر محلول‌پاشی برگی روی افزایش یافت و بیشترین درصد اسانس در گیاهان تیمار شده با نانونوذر روی در سطح ۱۰۰ میلی‌گرم مشاهده شد (شکل ۳). در آزمایش مشابه، تاثیر

نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد برگ‌های اکسید روی معمولی و نانوذره اکسید روی در سطوح مختلف تاثیر مثبت معنی‌دار بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و کمیت و کیفیت اسانس ریحان دارد. بیشترین مقدار شاخص‌های رشدی، رنگیزه‌های کلروفیل a، b و کارتنوئیدها و نیز درصد اسانس در گیاهان محلول‌پاشی شده با ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذره روی مشاهده شد. بررسی ترکیبات اصلی اسانس ریحان مشخص کرد که مونوترپن‌های اکسیژن‌دار درصد مهمی از ترکیبات ثانویه موجود در اسانس را تشکیل می‌دهند. بیشترین میزان اسانس را سه ترکیب متیل چاویکول، لینالول و الفا کادینول شامل می‌شوند. همچنین کاربرد برگ‌های نانوذره روی در سطح ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر بیشترین مقدار متیل چاویکول و آلفا کادینول را ایجاد کرد. بنابراین کاربرد برگ‌های روی و بخصوص نانوذره روی، نقش مهمی در افزایش زیست‌توده و اسانس گیاه ارزشمند ریحان دارد.

#### تقدیر و تشکر

از دانشگاه مراغه بابت حمایت مالی از انجام این پژوهش قدردانی می‌شود.

در حالی که سزکوئی‌ترین‌ها کاهش می‌یابند. حسن پوراقدم و همکاران (۱۸) مشخص کردند که متیل چاویکول به عنوان ماده اصلی *Ocimum basilicum* با تیمار سولفات روی افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که روی با تاثیر بر مسیرهای متابولیکی اولیه در نهایت منجر به بیوسنتز اجزای فعال اسانس می‌شود (۱۸). Misra و همکاران (۲۴) اظهار داشتند که بین مسیرهای متابولیکی اولیه و بیوسنتز/تجمع متابولیت‌های ثانویه در گیاه *Pelargonium graveolens* ارتباط موثری وجود دارد. در مطالعه حاضر، کاربرد برگ‌های نانوذره روی در سطح ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر باعث افزایش دو متابولیت اصلی ریحان یعنی متیل چاویکول و آلفا-پی کادینول شد (جدول ۱). کاربرد نانوذره روی به صورت کمپلکس با آمینو لولینیک اسید باعث افزایش مقدار متیل چاویکول در گیاه *Pimpinella anisum* شد (۳۸). ذرات نانو ممکن است افزایش ملایمی در تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول ایجاد کنند (۶)، که این امر می‌تواند باعث تغییر در متابولیسم ثانویه شده و سیستم آنتی‌اکسیدان را فعال کند. بنابراین، استفاده از کود نانو به عنوان الیسیتور، با تغییر در ترکیب شیمیایی اسانس، می‌تواند برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه مورد نظر مفید باشد (۲۳).

#### منابع

- ۱- امیدبگی، ر، ۱۳۹۳. روش‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد سوم، انتشارات به نشر، ۴۰۰ صفحه.
- ۲- رستمی، ق، مقدم، م، قاسمی پیربلوطی، ع، تهرانی فر، ع، ۱۳۹۹. اثر سولفات و نانوذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن‌های اسانسی نعناع فلفلی (*Mentha piperita* L.) تحت تنش شوری. پژوهش‌های گیاهی، ۳۳(۳)، ۵۱۵-۵۰۵.
- ۳- فتحی، ع، زاهدی، م، ترابیان، ش، ۱۳۹۴. ارزیابی اثر محلول پاشی اکسید روی به فرم معمول و نانوذرات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای پرولین در دو رقم *Zea Mays* L. تحت تنش شوری. علوم گیاهان زراعی ایران، ۴۶(۲)، ۲۶۶-۲۵۷.
- ۴- فلاحی، ع، عباس حسینی، ع، سفیدکن، ف، ۱۳۹۵. اثر محلول‌پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه
- ریحان (*Ocimum basilicum* L.). دوامنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۳۲(۵)، ۷۵۷-۷۴۳.
- ۵- محمودسلطانی، ش، اله‌قلی‌پور، م، شکوری کئیگری، م، پیکان، م، شعبانزاده، ح، عطار، ا، طبالوندی، ع، کشتکار، ف، ۱۳۹۹. بررسی تأثیر کاربرد همزمان مصرف خاکی و محلول‌پاشی کود سولفات روی بر عملکرد، مقدار پروتئین دانه و محتوای روی در اندام‌های گیاه برنج در مراحل مختلف رشد. نشریه پژوهش‌های خاک، ۳۴(۳)، ۳۲۸-۳۰۹.
- ۶- میری، م، خندان بارانی، ه، ۱۳۹۵. تاثیر نانوذره اکسید مس بر رشد، مقدار پروتئین، کلروفیل‌ها و کاروتن جلبک (*Chlorella vulgaris*). پژوهش‌های گیاهی، ۲۹(۱)، ۲۴۲-۲۳۵.

- 7- Abbasi, A. and Enayati, V., 2013. Decrease of cell defense mechanisms efficiency and oxidative stress accruing in lake of Mg condition. *Iranian Journal of Dryland Agriculture*, 1(4), 41-52.
- 8- Adrees, M., Khan, Z., Hafeez, M., Rizwan, M., Hussain, K., Asrar, M., Alyemeni, M., Wijaya, L., Ali, S., 2021. Foliar exposure of zinc oxide nanoparticles improved the growth of wheat (*Triticum aestivum* L.) and decreased cadmium concentration in grains under simultaneous Cd and water deficient stress. *Ecotoxicology and environmental safety*, 208, 111627.
- 9- Alloway, B.J., 2008. *Zinc in Soils and Crop Nutrition*, second ed. International Zinc Association and International Fertilizer Industry Association, Brussels, Belgium/Paris, France.
- 10- Andrade, E., Alves, C., Guimarães, E., Carreira, L., Maia J., 2011. Variability in essential oil composition of *Piper dilatatum* LC Rich. *Biochemical Systematics and Ecology*, 39(4), 669-75.
- 11- Arnon, A. N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. *Agronomy Journal*, 23, 112-121.
- 12- Asadi-Samani, M., Rafieian-Kopaei M., Azimi, N., 2013. *Gundelia: A Systematic Review of Medicinal and Molecular Perspective*. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 16(21), 1238-47.
- 13- Babaei, K., Sharifi, R.S., Pirzad, A. and Khalilzadeh, R., 2017. Effects of bio fertilizer and nano Zn-Fe oxide on physiological traits, antioxidant enzymes activity and yield of wheat (*Triticum aestivum* L.) under salinity stress. *Journal of Plant Interactions*.12, 381-389.
- 14- Cakmak, I., 2008. Enrichment of cereal grains with zinc: agronomic or genetic biofortification? *Plant Soil* 302, 1-17.
- 15- Dehabadi, S.Z., Asrar, Z. and Mehrabani, M., 2010. Biochemical changes in terpenoid compounds of *Mentha spicata* essential oils in response to excess zinc supply. *Iranian Journal of Plant Biology*, 2(1), 1-10.
- 16- Fattahi, B., Arzani, K., Souri, M.K. and Barzegar, M., 2020. Effect of cadmium and lead on morpho-physiological traits and Photosynthesis of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.). *Iranian Journal of Horticultural Science*, 50(4), 839-849.
- 17- Hanif, M.A., Nawaz, H., Ayub, M.A., Tabassum, N., Kanwal N., Rashid N., Saleem, M., Ahmad, M., 2017. Evaluation of the effects of Zinc on the chemical composition and biological activity of basil essential oil by using Raman spectroscopy. *Industrial Crops and Products*, 96, 91-101.
- 18- Hassanpouraghdam, M.B., Gohari, G.R., Tabatabaei, S.J., Dadpour, M.R. and Shirdel, M., 2010. NaCl salinity and Zn foliar application influence essential oil composition of basil (*Ocimum basilicum* L.). *Acta agriculturae Slovenica*, 97(2), 93-95.
- 19- Heidarian, E., Rafieian-Kopaei, M., 2012. Effect of silymarin on liver phosphatidate phosphohydrolase in hyperlipidemic rats. *Bioscience Research*, 9(2), 59-67.
- 20- Li, X. M., Tian, S. L. and Pang, Z. C., 2009. Extraction of cuminum cyminum essential oil by combination technology of organic solvent with low boiling point and system distillation. *Food Chemistry*, 115, 1114-1119.
- 21- Lobiuc, A., Vasilache, V., Oroian, M., Stoleru, T., Burducea, M., Pintilie, O., Zamfirache, M.M., 2017. Blue and red LED illumination improves growth and bioactive compounds contents in acyanic and cyanic *Ocimum basilicum* L. microgreens. *Molecules*, 22, 4.
- 22- Marschner, H., 1995. *Mineral nutrition of higher plants*. Second edition, Academic Press Limited. Harcourt Brace and Company, Publishers, London, pp. 347-364.
- 23- Marslin, G., Sheeba, C.J., Franklin, G., 2017. Nanoparticles alter secondary metabolism in plants via ROS burst. *Frontiers in Plant Science*, 8, 832.
- 24- Misra, A., Srivastava, A.K., Srivastava, N.K. and Khan, A., 2005. Zn-acquisition and its role in growth, photosynthesis, photosynthetic pigments and biochemical changes in essential monoterpene oil(s) of *Pelargonium graveolens*. *Photosynthetica*, 43(1), 153-155.
- 25- Movahhedi Dehnavi, M., Modarres Sanavi, A.M., Soroush-Zade, A. and Jalali, M., 2004. Changes of proline, total soluble sugars, chlorophyll (SPAD) content and chlorophyll fluorescence in safflower varieties under drought stress and foliar application of zinc and manganese. *Biaban*, 9(1), 93-110.
- 26- Naderi, M.R. and Danesh-Shahraki, A., 2013. Nanofertilizers and their roles in sustainable agriculture. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences*, 5(19), 2229-2232.
- 27- Pirmoradi, M.R., Moghaddam, M., Farhadi N., 2013. Chemotaxonomic Analysis of the Aroma

- Compounds in Essential Oils of Two Different *Ocimum basilicum* L. Varieties from Iran. *Chemistry & Biodiversity*, 10, 1361-1371.
- 28- Prasad, T., Sudhakar, P., Sreenivasulu, Y., Latha, P., Munaswamy, V., Reddy, K.R., Sreeprasad, T., Sajanlal, P., Pradeep, T., 2012. Effect of nanoscale zinc oxide particles on the germination, growth and yield of peanut. *Journal of Plant Nutrition*, 35, 905-927.
- 29- Reed, R.B., Ladner, D.A., Higgins, C.P., Westerhoff, P., Ranville, J.F., 2012. Solubility of nano-zinc oxide in environmentally and biologically important matrices. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 31, 93-99.
- 30- Rossi, L., Fedenia, L.N., Sharifan, H., Ma, X., Lombardini, L., 2019. Effects of foliar application of zinc sulfate and zinc nanoparticles in coffee (*Coffea arabica* L.) plants. *Plant Physiology and Biochemistry*, 135, 160-166.
- 31- Rout, G., & Das, P., 2003. Effect of metal toxicity on plant growth and metabolism: I. Zinc. *Journal of Agronomy*, 23, 3-11.
- 32- Saa, S., Negron, C., Brown, P., 2018. Foliar zinc applications in Prunus: From lab experience to orchard management. *Scientia Horticulturae*, 233, 233-237.
- 33- Sestili, P., Ismail, T., Calcabrini, C., Guescini, M., Catanzaro, E., Turrini, E., Layla, A., Akhtar, S., Fimognari, C., 2018. The potential effects of *Ocimum basilicum* on health: a review of pharmacological and toxicological studies. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology*, 14, 679-692.
- 34- Siddiqui, Z.A., Parveen, A., Ahmad, L., Hashem, A., 2019. Effects of graphene oxide and zinc oxide nanoparticles on growth, chlorophyll, carotenoids, proline contents and diseases of carrot. *Scientia Horticulturae* 249, 374-382.
- 35- Souri, M.K. and Dehnavard, S., 2018. Tomato plant growth, leaf nutrient concentrations and fruit quality under nitrogen foliar applications. *Advances in Horticultural Science*, 32(1), 41-47.
- 36- Souri, M.K. and Hatamian, M., 2019. Aminochelates in plant nutrition; a review. *Journal of Plant Nutrition*, 42(1), 67-78.
- 37- Souri, M.K., Naiji, M., Kianmehr, M.H., 2019. Nitrogen release dynamics of a slow release urea pellet and its effect on growth, yield, and nutrient uptake of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.). *Journal of plant nutrition*, 42(6), 604-614.
- 38- Tavallali, V., Rahmati, S., Rowshan, V., 2017. Characterization and influence of Green synthesis of nano-sized zinc complex with 5-aminolevulinic acid on bioactive compounds of aniseed. *Chemistry & Biodiversity*, e1700197
- 39- Tavallali, V., Rowshan V., Bahmanzadegan, A., 2018. Variations in sweet basil in response to Green synthesized Zinc-Amino nano complexes. *Journal of Cleaner Production*, 196, 452-459.
- 40- Yadghari, R., Nyakan, M. and Mosavat, A., 2014. The effect of nano and non-nano forms chelate zinc on growth, chlorophyll content and soluble sugar pea plants (*Cicer arietinum* L.) in different levels of salinity. *Iranian Journal of Plant Ecophysiology Research*, 9, 137-150.

# The effect of foliar application of zinc oxide and zinc nanoparticles on growth, photosynthetic pigments and essential oil compounds of green basil

Aghaee A.<sup>1,\*</sup>, Shahabivand S.<sup>1,\*</sup>, Athari M.<sup>1</sup> and Nasiri Y.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dept. of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Maragheh, Maragheh, I.R. of Iran

<sup>2</sup>Dept. of Plant production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, I.R. of Iran

## Abstract

Zinc as an essential micronutrient element has an important impact on the growth and metabolism in plants. This experiment was carried out to evaluate the effect of foliar application of zinc on growth, photosynthesis pigments, and essential oil quantity and quality of basil under greenhouse conditions. The treatments were four levels zinc oxide (0, 25, 50, 100 mg/L) and four levels zinc oxide nanoparticles (0, 25, 50, 100 mg/L). The results showed that foliar application of zinc had significant influence on the evaluated parameters. Treatments of Zinc oxide and zinc nanoparticle significantly increased plant length, plant wet and dry weights, leaf number per plant, photosynthesis pigments contents and essential oil percent, and in this regard, zinc nanoparticle impact was more effective than zinc oxide. The highest growth parameters and pigments content were observed at 100 mg/l zinc nanoparticle. Based on the results, 34 components were identified in the basil essential oil that maximum amounts were oxygenated monoterpenes, and three main components were methyl chavicol, linalool and alpha-cadinol. Also, maximum amount of methyl chavicol and alpha-cadinol was observed under 50 mg/l nanoparticles. Zinc has probably increased growth and production of essential oils in basil by increasing the growth hormones, improving the uptake of some nutrients, and increasing the synthesis of precursors of secondary metabolites. The findings of this study showed that the effect of zinc nanoparticle was more effective than zinc oxide in increasing growth and active substances of basil.

**Key words:** Basil essential oil, Zinc oxide, Foliar spraying, Zinc nanoparticle