



بررسی عدد کروموزومی چند گونه گیاهی بومی ایران

سعیده سادات میرزاده واقفی* و عادل جلیلی

ایران، تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلهای و مراعع کشور

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

چکیده

عدد کروموزومی یکی از موارد مهم و کمک کننده در بررسی حد و مرز گونه‌ها و جنس‌ها در گیاهان می‌باشد. در این تحقیق به بررسی عدد کروموزومی غیرجنSSI ۷ گونه گیاه بومی ایران پرداخته شد. *Achillea vermicularis* Trin. ($2n = 36$)، *Nepeta* ($2n = 26$)، *Cousinia multiloba* DC. ($2n = 20$)، *Codonocephalum peacockianum* Aitch. & Hemsl. ($2n = 22$)، *Rumex elbursensis* Boiss. ($2n = 22$)، *Pteropyrum aucheri* Jaub. & Spach. ($2n = 36$)، *Reaumuria oxiana* (Ledeb.) Boiss. ($2n = 30$)، *Reaumuria oxiana*، *Rumex elbursensis* *Pteropyrum aucheri*، *Nepeta heliotropifolia* Lam. کروموزومی گونه‌های *Cousinia multiloba* و *Codonocephalum peacockianum* برای اولین بار و عدد کروموزومی میتوz برای اولین بار گزارش می‌شوند. هدف از این تحقیق کامل نمودن فهرست عدد کروموزومی گیاهان بومی ایران است. محاسبات توسط نرم-افزارهای های Excel و Micromeasure 3.3 انجام شد.

واژه‌های کلیدی: ایران، شمارش کروموزومی، گیاهان خودرو، متافاز.

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۸۶۳۳، پست الکترونیکی: Mirzadeh@rifr_ac.ir

مقدمه

تلaci بین گونه‌ای برای جمع‌آوری ژن‌های مطلوب در یک گیاه وجود خواهد داشت. بنابراین، کروموزوم‌ها عوامل مناسبی هستند که می‌توان براساس آنها روند تکاملی گیاهان را تعیین کرد (۴). شایان ذکر است گونه‌ها بر اساس خانواده انتخاب و بررسی نشده‌اند. این تحقیق، با تمرکز بر روی عدد کروموزومی گیاهان خاص و انحصاری ایران صورت گرفت. منظور از گونه‌های خاص گونه‌هایی هستند که از جهت زیستی، دارویی، اقتصادی، صنعتی و ... برای ما دارای ارزش می‌باشند. عدد کروموزومی تعدادی از گونه‌ها برای اولین بار گزارش می‌شود و به همین دلیل این تحقیق دارای ارزش بالایی برای تکمیل عدد کروموزومی گیاهان بومی ایران است. جهت جلوگیری از پراکنده‌گویی پیشینه و بحث هر گونه در کنار آن آورده شده است.

تحقیقات بر روی کروموزوم‌ها به روشن شدن روابط بین تاکسون‌ها کمک می‌کند (۳۵). عدد کروموزومی ساده‌ترین پارامتری است که اطلاعات ارزشمندی را در بررسی‌های سیتوتاکسونومیکی و ژنوم یک گونه ایجاد می‌کند (۲۰). در ژنوم گیاهان اطلاعات ژنتیکی حامل اطلاعات فنوتیپ گیاهان است و به همین دلیل مطالعات سلولی دارای اهمیت بالایی است (۳۶). عدد کروموزومی گونه‌ها یکی از منابع موثق و قابل بررسی برای گونه‌های مختلف گیاهی است. در یک گونه با افزایش اختلافات سازشی ممکن است واریته‌های جدید و حتی گونه‌های جدید در جوامع گیاهی بوجود آید (۲۱). بدیهی است گونه‌هایی که از نظر پارامترهای سیتوژنتیک و خواص کروموزومی به هم شبیه هستند، در بحث روابط بین گونه‌ای قربات بیشتری داشته و در صورت وجود صفات مطلوب در این گونه‌ها، امکان

اتانول) به مدت ۴ ساعت قرار گرفتند. پس از شستشو در محلول الكل ۷۰٪ نگهداری شدند. برای تهیه لام میکروسکوپی ریشه‌ها با اسید کلریدریک ۱ نرمال در حمام آب گرم دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه هیدرولیز گردیدند. سپس نمونه‌ها با هماتوکسیلین رنگ آمیزی شدند و با اسکالپل جدا و روی لام قرار گرفتند. با ضربه روی لام سلول‌های ریشه چه از هم جدا و آماده شدند. با این روش سلول‌های در حال تقسیم در مرحله متافاز جهت انجام مطالعات سیتوژنتیک ثبت شدند. شمارش کروموزومی و تهیه عکس از نمونه‌ها با میکروسکوپ نوری Olympus BH2 با بزرگنمایی ۱۶۰۰ انجام شد. برای هر گونه ۳ تا ۵ تکرار صورت گرفت. آماره‌های سیتوژنتیک با نرم افزار 3.3 Micromeasure محسابه شد. رسم ایدیوگرامها و تقسیم‌بندی کروموزوم‌ها با نرم افزار Excel صورت گرفت. تقسیم‌بندی کروموزوم‌ها بر اساس روش لوان و همکاران (۲۶) صورت گرفت.

مواد و روشها

انتخاب گونه‌ها بر اساس لیست بذری است که سالانه توسط باغ‌گیاه شناسی جهت تبادل بذر با سایر باغ‌های گیاه‌شناسی دنیا جمع‌آوری می‌شود انجام شد. از بین آنها گونه‌های انحصاری و خاص (زیستی، دارویی، صنعتی و ...) جهت این تحقیق انتخاب شدند. لذا بر اساس تعداد جمعیتی که در دسترس بود، برای هر گونه مطالعه صورت گرفت. نمونه‌های گیاهی در هرباریوم موسسه تحقیقات چنگلها و مراعع کشور (TARI) نگهداری می‌شوند. بذرها بعد از جمع‌آوری و بوجاری در دمای ۰-۴ درجه سانتی-گراد نگهداری می‌شوند. بذرها در پتری دیش کشت شد. در صورت جوانه‌زنی بذر، زمان ۳ الی ۵ روز لازم بود تا طول ریشه، مناسب جهت انجام کار شود. سلول‌های مریستمی ریشه چه با اسکالپل جدا و داخل ماده آلفابرومونفتالین تحت تیمار قرار داده شد. بدین ترتیب تقسیم میتوز در سلول‌های مریستمی در مرحله متافاز متوقف می‌شود. برای فیکس کردن ریشه‌ها داخل ماده فیکساتیو فارمر (محلول ۱ به ۳ اسید استیک گلابیال و

جدول ۱- گونه‌های بررسی شده در تحقیق

ردیف	نام علمی	خانواده	محل جمع آوری
۱	<i>Achillea vermicularis</i> Trin.	Asteraceae	دموند، هویر. ۱۳۹۴/۵/۲۴. ۲۴۳۰ متر. محی (TARI).
۲	<i>Codonocephalum peacockianum</i> Aitch. & Hemsl.	Asteraceae	ارومیه دره قاسملو، ۱۳۹۳/۶/۶. ۱۴۷۰ متر، محی (TARI).
۳	<i>Cousinia multiloba</i> DC.	Asteraceae	تهران، توچال، ۱۳۹۴/۶/۲۸. ۲۷۰۰ متر، اشرفی (TARI).
۴	<i>Nepeta heliotropifolia</i> Lam.	Lamiaceae	زنجان، قره پوشلو، روستای مشکین، ۱۳۹۴/۶/۴. ۲۱۵۰ متر، محی (TARI).
۵	<i>Pteropyrum aucheri</i> Jaub. & Spach.	Polygonaceae	گیلان به زنجان، علی آباد، ۱۳۹۴/۶/۷. ۳۳۴ متر، محی (TARI).
۶	<i>Rumex elbursensis</i> Boiss.	Polygonaceae	تهران، جاده چالوس، تونل کندوان، ۱۳۹۳/۵/۲۰. ۲۹۷۰ متر، محی (TARI).
۷	<i>Reaumuria oxiana</i> (Ledeb.) Boiss.	Tamaricaceae	جنوب سیزوار، غرب دارونه، ۱۳۹۴/۷/۱۳. ۹۰۰ متر، محی (TARI).

جنس *Achillea* L. بومادران از تیره (Asteraceae)

مرکبان، دارای حدود ۱۳۵ گونه علفی چند ساله است که در اروپا، آسیا و بخش‌هایی از شمال آفریقا یافت می‌شود.
.(۳۰)

نتایج

عدد کروموزومی گونه‌های مورد بررسی بدین شرح است:


Asteraceae

Achillea vermicularis

$2n = 36$




الف






ب




ج



د





شکل ۱- کروموزوم‌های متافاز الف: *Codonocephalum peacockianum* ($2n = 20$)؛ ب: *Achillea vermicularis* ($2n = 36$)؛ ج: *Rumex* ($2n = 22$)؛ د: *Pteropyrum aucheri* ($2n = 36$)؛ ذ: *Nepeta heliotropifolia* ($2n = 26$)؛ ر: *Cousinia multiloba* ($2n = 22$)؛ ز: *Reaumuria oxiana* ($2n = 30$)؛ چ: *elbursensis* ($2n = 22$)

گونه *A. vermicularis* در ایران، عراق، ترکیه و قفقاز انتشار دارد. پراکنش این گونه در مناطق ایرانی تورانی و خزری گزارش شده است (۶،۵). عدد کروموزومی گونه‌های مختلف *Achillea* متفاوت است و بین $2x=18$ تا $2x=72$ گزارش شده است (۳۳؛ ۱۶؛ ۸). عدد پایه $x=9$ می‌باشد (۱۹ و ۱۸). عدد کروموزومی همه گزارش‌ها $x=9$ می‌باشد (۱۸). عدد کروموزومی گونه *A. vermicularis* ($2n = 4x = 36$) بدست آمد، که با عدد کروموزومی سایر تحقیقات همخوانی دارد (۳۳)

همچنین گونه‌های اندکی از این جنس در آمریکای شمالی و نیمکره جنوبی نیز گزارش شده است (۲۴ و ۳۱). زیستگاه این جنس عمدتاً تنوع وسیعی از نواحی بیابانی تا نواحی مرطوب، سواحل دریاها و یا ارتفاعات را شامل می‌شود (۱). گونه از جنس بومداران در کشور ایران پراکنش دارند و بومی هستند (۴،۵). اقلیم مناسب این گیاه در مناطق معتدل و نیمه خشک است.

۱۴۰۱، شماره ۳۵، جلد

می باشد. از نظر تقارن در گروه $2B$ قرار می گیرد(شکل ۱، ج).

Lamiaceae

Nepeta heliotropifolia

۲۰۱۶

جنس *Nepeta* L. در جهان حدود ۳۰۰ گونه دارد (۲۲). بر اساس فلور ایران حدود ۷۵ گونه در ایران دارد (۲۳). گونه‌گزارش شده در این تحقیق در ایران، روسیه، اوکراین، ارمنستان، گرجستان و ترکیه دارای پراکنش است.

طیف وسیعی از اعداد کروموزومی توسط تحقیقات قبلی برای این جنس گزارش شده است. عدد کروموزومی گونه های مختلف *Nepeta* در گزارشات قبلی $n=16, 18, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 42, 54$ و $2n=9, 11, 13, 17, 19, 23, 34, 36, 42, 54$ می باشد (۱۱، ۱۸، ۲۳، ۳۴). عدد کروموزومی *N. heliotropifolia* گونه بارگزارش می شود. کروموزوم های آن کوچک و همه متاسانتریک هستند (۱۸m). از نظر تقارن در گروه B قرار می گیرد (شکل ۱، د). در بررسی عدد کروموزومی گونه های نزدیک به گونه *N. heliotropifolia* می توان به اشاره نمود که در میوز ۱۸ و *Nepeta racemosa* Lam. بدست آمده است (۱۰ و ۱۷). عدد کروموزومی $n=9$ بدست آمد (۱۷). عدد کروموزومی $n=16$ و $2n=36$ *Nepeta persica* Boiss. عدد کروموزومی گونه مورد بررسی در تحقیق حاضر است (۲۳).

Polygonaceae
Pteropyrum aucheri
¶n=¶¶

جنس *Kochia* جنس *Pteropyrum* Jaub. & spach است با ۵ گونه که در ایران، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، عمان و عراق پراکنش دارد (۲۷، ۲۸). این جنس در ایران ۳ گونه دارد (۲۸) و از خانواده Polygonaceae می‌باشد. گونه *P. aucheri* در

(شکل ۱، الف). فرمول کاریوتیپی آن $4n = 36$ است. کروموزوم‌های این گونه از نظر تقارن در گروه ۲B قرار می‌گیرد. در گونه *A. wilhelmsii* C.Koch ، گونه نزدیک به گونه مورد بررسی در این تحقیق، دو عدد کروموزومی $2n = 36$ در یک جمعیت و $2n = 36$ در ۱۳ جمیعت دیگر گزارش شده است(۱۳).

Codonocephalum peacockianum

$$\gamma_n = \gamma^*$$

گونه در ایران دارد (۵). *C. peacockianum* در ایران، ترکیه، آسیای مرکزی و افغانستان انتشار دارد (۶). شمارش کروموزومی محلودی بر روی این جنس و گونه در سطح جهان صورت گرفته است. عدد کروموزومی *C. peacockianum* در تحقیق حاضر ($2n = 20$)، بدست آمد. فرمول کاریوتیبی آن $2m + 8sm$ است. کروموزوم‌های این گونه در تیپ ۲A قرار می‌گیرند (شکل ۱، ب). شمارش کروموزومی میوز این گونه ($n=10$) توسط سایر تحقیقات انجام شده است (۱۹ و ۱۸). نتیجه بدست آمده با تحقیقی حاضر مطابقت داد.

Cousinia multiloba

۲۶

جنس *Cousinia Cass.* در جهان حدود ۶۷۲ گونه دارد (۲۴). ۲۳۵ گونه علیغی یا خشبي از اين جنس در ايران انتشار دارند، که بسياري از آنها انحصاری ايران بوده یا در محلوده فلور ايرانيكا (ایران، افغانستان، پاکستان، تركمنستان و عراق) می رويند (۲۹). *C. multiloba* در ايران، افغانستان، پاکستان و تركمنستان پراکنش دارد. عدد کروموزومي های گزارش شده از اين جنس، $2n=26$ و $2n=24$ است (۱۸ و ۱۹). عدد کروموزومي ميتوز گونه *C. multiloba* $2n=26$ ، برای اولين بار گزارش می شود و با عدد کروموزومي گزارش شده از ميوز آن مطابقت دارد (۱۵). فرمول کاريوتيبی آن $4sm+9m+$

های مختلف و یا پلی‌پلوئیدی صورت گرفته باشد. در نتیجه، باعث ظهر گونه جدیدی شده که با شرایط آن محدوده سازش دارد. البته اثبات این فرضیه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

Tamaricaceae

Reaumuria oxiana

$2n=22$

جنس *Reaumuria* L. از خانواده Tamaricaceae می-

باشد. این جنس دارای ۱۲ گونه با پراکنش در شمال آفریقا، آسیا و جنوب اروپا می‌باشد (۴۰). این جنس دارای ۵ گونه در ایران است (۲). گونه *R. oxiana* در ایران، ترکیه، گرجستان، ترکمنستان، اوکراین و شوروی پراکنش دارد. عدد کروموزومی گونه *R. oxiana* $=2x=22$ (۲). برای اولین بار گزارش می‌شود. فرمول کاریوتیپی گونه *R. oxiana* ذکر شده است. گزارش دیگری در مورد گونه *R. cistoides* Adams مذکور در تحقیق حاضر $5sm+6m$ است و در گروه ۲B قرار می‌گیرد (شکل ۱، ز). گزارش دیگری در ایران (۷).

گونه *R. cistoides* سینونیم گونه *R. alternifolia* (Labill.) Britten var. *alternifolia* می‌باشد. از نظر فیلوجنی دو گونه گزارش شده از ایران همانند مختلفی هستند و در دو گروه کاملاً مجزا قرار می‌گیرند (۴۲). گزارش کروموزومی از گونه‌های دیگری این جنس در گونه *R. soongorica* (Pall.) Maxim از چین، $2n=22$ بدست آمده که با نتایج ما مطابقت دارد (۳۸). در تحقیق *R. soongorica* بر روی جمعیت‌های مختلف گونه *R. soongorica* دیگری برآمده که پیاپی که توسط واقعی زمین شناسی و تغییرات اقلیمی تعیین می‌شوند، نشانه‌هایی از گونه‌زایی را در این گونه نشان می‌دهند (۴۱). عدد کروموزومی تحقیق حاضر با گونه *R. soongorica* یکسان است که می‌تواند همانند آن حاصل واگرایی و هیبریداسیون‌های پیاپی باشد. در تحقیقی که بر روی فیلوجنی جنس *Reaumuria* صورت گرفت،

ایران، عراق، افغانستان و پاکستان پراکندگی دارد. عدد کروموزومی گونه *P. aucheri* ($P. aucheri$) $(2n=22)$ ، برای اولین بار گزارش می‌شود. بیشتر کروموزوم‌های این گونه متاسانتریک هستند. فرمول کاریوتیپی آن $9m+2sm+6m$ است. کروموزوم‌های آن در تیپ ۲A قرار می‌گیرد (شکل ۱، ذ). عدد کروموزومی گونه‌های دیگر جنس *Pteropyrum* تا کنون گزارش نشده است. در جنس‌های دیگر این خانواده از جمله *Atraphaxis* عدد کروموزومی مشابه دیده می‌شود (۱۸، ۱۹ و ۳۹).

Rumex elbursensis

$2n=30$

جنس *Rumex* L. حدود ۲۰۰ گونه در مناطق معتدلۀ اروپا، آمریکا، آسیا و استرالیا دارد (۱۹؛ ۲۵؛ ۳۲ و ۱۲). بر اساس فلور ایرانیکا ۲۳ گونه *Rumex* (ترشک) در ایران به صورت یکساله و چند ساله در سه زیر جنس پراکنش دارند (۲۸). طیف گستردۀای در عدد کروموزومی این جنس گزارش شده است. عدد کروموزومی ترشک بین ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۳۰، ۳۵، ۳۶، ۴۰ و ۴۲ است. گزارش شده از گونه *R. elbursensis* در این جنس $2n=200$ می‌باشد (۱۹). بر اساس تحقیقات گذشته هیبریدهای بین گونه‌ای می‌تواند باعث ایجاد گونه‌های جدید شوند (۹). فرضیه‌ای نشان می‌دهد، عدد کروموزومی $n=50$ در این گونه می‌تواند می‌دهد، عدد کروموزومی $2n=30$ در این گونه می‌تواند حاصل هیبریداسیون گونه‌های مختلف *Rumex* طی نسل-های متوالی یا پلی‌پلوئیدی در اثر تشکیل گامت‌های دیپلولید یاشد (۳۷). البته این مسئله در حد فرضیه می‌باشد و نیاز به بررسی بیشتر دارد. گونه *R. elbursensis* از گونه‌های انحصاری ایران می‌باشد، که عدد کروموزومی آن ($2n=30$) برای اولین بار گزارش شده است. کروموزوم‌های آن کوچک و همه متاسانتریک هستند (۳۰m). از نظر تقارن در تیپ ۱A قرار می‌گیرد (شکل ۱، ر). احتمال دارد، ایجاد این گونه انحصاری نیز در اثر انجام هیبریداسیون بین گونه-

سپاسگزاری

این تحقیق با استفاده از امکانات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور صورت گرفته است. بدینویسیله از همه همکارانی که در تهیه بذر و تجهیزات آزمایشگاهی ما را همراهی نموده‌اند قدردانی می‌گردد.

از نظر اجدادی قرابت زیادی با *R. oxiana* و *soongorica* هم دارند و هر دو در گروه غرب آسیای مرکزی قرار می‌گیرند. در حالیکه گونه *R. alternifolia* در گروه اجدادی مجزایی با منشا ایران و ترکیه قرار می‌گیرد (۴۲). پس منشا ایجاد گونه‌ها تفاوت‌هایی را که در عدد کروموزومی آنها دیده شد را توجیه می‌نماید.

منابع

- ۱- آذرنیوند ح، قوام عربانی م، سفید کن ف، طولی ع. ۱۳۸۸. بررسی تاثیر ویژگیهای اکولوژیکی بر کمیت انسانس گل و برگ *L Achilla millefolium*.subsp. *millefolium*: ۲۵-۵۷۱.
 - ۲- اسدی، م. ۱۳۶۷. فلور ایران (۱). تیره گز (Tamaricaceae). ویراستاران اسدی، م، معصومی، ع، ا، خاتمساز، م. و مظفریان، و آ، تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
 - ۳- جم زاد، ز. ۱۳۹۱. فلور ایران (تیره نعناعیان). مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. تهران. ۱۰۷۴ ص.
 - ۴- متینی‌زاده، م. ۱۴۰۰. نقد کتاب: فهرست کروموزومی گیاهان ایران (جلد اول). نشریه طبیعت، ۶(۱): ۱۶۳-۱۶۱.
 - 14-Djavadi, S. B & Attar, F. 2010 . New Chromosome Counts in the Genus *Cousinia* (Asteraceae, Cardueae) from Iran. Willdenowia. 40(2): 351–357.
 - 15-Doostmohammadi, M., Malekmohammadi, M., Djamali, M. & Akhani, H. 2019. Is *Pteropyrum* a pathway to C4 evolution in Polygonaceae? An integrative approach to the taxonomy and anatomy of *Pteropyrum* (C3), an immediate relative of *Calligonum* (C4). Botanical Journal of the Linnean Society 1-32.
 - 16-Ebrahim, F., Pakniyat, H., Arzani, A and new chromosome number reports in *Achillea* species. Biologia 67(2): 284—288.
 - 17-Ghaffari, S. M. & Kelich K. 2006 . New or rare chromosome counts of some angiosperm species from Iran.-Iranian Journal of Botany. 12 (1): 81-86. Tehran.
 - 18-Goldblatt, P. 1984- 1988. Index to Plant Chromosome Numbers. Monographs in Systematic Botany. Missouri Botanical Garden, St. Louis.
- 8-Afshari,F., Ebrahimi,M., Akbari,M., & Farajpour,M.,2013.Cytological investigations and new chromosome number reports in yarrow (*Achillea millefolium* Linnaeus, 1753) accessions from Iran. Comparative Cytogenetics. 7(4): 271–277.
- 9-Arnold, M. L., 1997. Natural hybridization and evolution.- Oxford.
- 10-Aryavand, A. 1975. Contribution a l, etude cytotaxonomique de quelques Angiospers de l, Iran. Botaniska Notiser. 128: 299-311.
- 11-Bordbar, F. & Mirtadzadini, M. 2018. New chromosome counts in some plant species from east and south-east Iran. Nova Biologica Reperta 5 (3): 257-261.
- 12-Chase, M. & Reveal, A. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of Linnaean Society 161(2): 105-121.
- 13- Chehregani, A., Heidian, M., & Jalali, F. 2013.Cytological investigations on *Achillea wilhelmsii* C.Koch (Asteraceae) in the western part of Iran. Chromosome Botany. 8(1): 13-16.

- 19-Goldblatt, P. & Johnson, D.E. (Eds.), 1990 forthcoming: Index to plant chromosome numbers. Monographs in Systematic Botany. & Rahimmalek, M. 2012. Karyotype analysis
- 20- Guerra, M., 2008: Chromosome numbers in plant cytobotany: concepts and implications. - Cytogenetic and Genome research, 120: 339-350.
- 21-Heywood, V.H. 1978. Flowering Plants of the World. Oxford University Press Oxford: 336 pp. 2.
- 22-Jamzad,Z., Ingrouille, M. Monique S. Simmonds, J., 2003.Three new species of *Nepeta* (Lamiaceae) from Iran. TAXON. 52:93-98
- 23-Kharazian, N.,Zamani Shourabi, S. & Yousefi, M.2013. Chromosome count and karyotype study of eleven *Nepeta* L. (Lamiaceae) species from Iran Biological Diversity and Conservation. 6(1): 76-87.
- 24-Kiran, Y., Arabaci, T., Sahin, A. & Turkoglu, I., 2008. Karyological notes on another eight species of *Achillea* (Asteraceae) from Turkey. Biologia. 63: 343-348.
- 25-Knapp, H.D. 1987.On the distribution of the genus *Cousinia* (Compositae). Plant Systematics and Evolution. 155, 15–25.
- 26-Levan, A., Fredge, K., & Sandberg, A., 1964. Nomenclature for centromeric position on chromosome. Hereditates 52: 201-220.
- 27-Qaiser, M. 2001. Polygonaceae. In: Flora of Pakistan (eds.): Ali, S.I. & Qaisar, M., Karachi University and Missouri Botanical Garden, St Louis, Missouri, U.S.A. 205: 110-124. 3.
- 28-Rechinger, K. H. & Schiman- Czeika, H. 1968. Polygonaceae in K. H. Rechinger (ed.) *Flora Iranica* no. 56. –Graz.
- 29-Rechinger, K.H. 1972. Compositae-Cynareae I: *Cousinia*. In: Rechinger, K.H. (Ed.) *Flora Iranica*, vol. 90. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, pp. 1–329.
- 30-Rechinger, K.H. 1986. *Achillea*. In Flora Iranica, compositae No. 158: 53-54.
- 31-Safaraova, L. & Duchoslav, M., 2010. Cytotype distribution in mixed populations of polyploidy *A. oleraceum* measured at a microgeographic scale. Presila, 82: 126-136.
- 32- Sanchez, I. & Kron, K.A. 2008. Phylogenetics of Polygonaceae with an emphasis on the evolution of Eriogonoideae. Systematic Botany 33(1): 87-96. 4.
- 33-Sheidai, M., Azani, N. & Attar, F. 2009. New chromosome number and unreduced pollen formation in *Achillea* species (Asteraceae). Acta Biologica Szegediensis 53(1):39-43
- 34-Singh Saggoo,M.I., Srivastava, D. K. & Grewa, P, 2011. Meiotic Studies in 14 Species of the *Nepeta* L. (Lamiaceae) From Cold Desert Regions of Lahaul-Spiti and Adjoining Areas of Northwest-Himalaya, India. Cytologia 76(3): 231–236.
- 35-Soltis, D. E. 2014. Chromosome data. Iranian Journal of Botany. 20: 228-229.
- 36- Stace, C. A., & Aquier, p. 1978. Taxonomy and variation of *Vulpia ciliatae* Dumorr. Botanical Journal of the Linnean Society. 77: 107-112.
- 37-Swedlistka, Z. & Zuk, J. 1965. Further observations on spontaneous polyploidization in *Rumex* hybrids. Acta societatis botanicorum poloniae. Vol: XXXIV- 3:439-450.
- 38-Wang, X., Zhang, T., Wen, Z., Xiao, H., Yang, Z.,Chen, G. & Zhao, X., 2011. The chromosome number, karyotype and genome size of the desert plant diploid *Reaumuria soongorica* (Pall.) Maxim. Plant Cell Repots. 30:955–964.
- 39- Xinmin, T.,RuiruiL.,Tian, B. & Jianquan L. 2014.Karyological studies of *Parapteropyrum* and *Atrapaxis* (Polygonaceae). Caryologia - Firenze- 62(4):261-266.
- 40-Yang, G. & Gaskin, J. 2006. Tamaricaceae. Flora of China 13: 58–69.
- 41-Yong Sh., Xia Y., Heng-Xia Y., Chao-Ju Q., Xing-Ke F., Xiao-Yue Y., Yu-Xiao Ch., Cheng-Jun Zh. & Xiao-Fei M. 2019. Divergence and hybridization in the desert plant *Reaumuria soongarica*. Journal of Systematics and Evolution 58 (2): 159-173.
- 42- Zhang, M. , Hao, X., Sanderson, S. C., Vyacheslav, B. V., Sukhorukov, A. P. & ZHANG, X. 2014.Spatiotemporal evolution of *Reaumuria* (Tamaricaceae) in Central Asia: insights .Phytotaxa 167 (1): 089–103

Investigation of chromosome number of several plant species native to Iran

Mirzadeh Vaghefi S.S. and Jalili A.

Botany Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. of Iran.

Abstract

Chromosome number is one of the most important and helpful factors in examining the boundaries of species and genera in plants. In this study, the somatic chromosomal number of 7 species of native plants of Iran was investigated. In this study, *Achillea vermicularis* Trin. ($2n=36$), *Codonoccephalum peacockianum* Aitch. & Hemsl. ($2n=20$), *Cousinia multiloba* DC. ($2n=26$), *Nepeta heliotropifolia* Lam. ($2n=36$), *Pteropyrum aucheri* Jaub. & Spach. ($2n=22$), *Rumex elbursensis* Boiss. ($2n=30$), *Reaumuria oxiana* Boiss. ($2n=22$) was reported. Chromosome numbers of *Nepeta heliotropifolia*, *Pteropyrum aucheri*, *Rumex elbursensis*, *Reaumuria oxiana* were reported for the first time. The Chromosome numbers of mitosis of *Codonoccephalum peacockianum* and *Cousinia multiloba* were reported for the first time. The purpose of this research is to complete the index chromosome of native plants of Iran. Analyses were performed by Micromeasure 3.3 and Excel softwares.

Key words: Chromosome count, Iran, metaphase, native plants.